

CATALOGUE

DES PLANTES,

ARBRES, ARBRISSEAUX,

ET ARBUSTES,

*DONT on trouve des Graines, des Bulbes,
& du Plant, chez le sieur VILMORIN-
ANDRIEUX, Marchand Grainier-Fleuriste
& Botaniste du Roi, & Pépiniériste.*

NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE.

*Manè semina semen tuum; & vesperè non cesset
manus tua. Ecclæ. XI. 6.*

3043.
H. a.

Prix 24 sols broché.



A P A R I S,

Chez ledit Sieur VILMORIN-ANDRIEUX, Quay de la
Mégisserie, à l'Enseigne du Roi des Oiseaux & de
la Renommée, près le Caffé du Midi.

M. DCC. LXXXIII.





A V I S.

NOTRE Catalogue n'a pas déplu au Public, puisqu'il nous en demande une nouvelle Edition. Le grand nombre d'additions intéressantes que nous y faisons, sont au moins une nouvelle preuve que nous désirons autant d'être utiles aux amateurs, que de faire connoître les objets de notre commerce. Nous avons, comme dans les précédentes, joint à chaque Espece & Variété, en moins de mots qu'il nous a été possible, le caractère qui la distingue, la saison de ses productions, le tems & les attentions convenables à sa culture, & sa phrase latine en faveur des Etrangers à qui notre nomenclature n'est pas familière.

Mais nous ne donnons qu'un Catalogue, je le répète; & nous ne devons pas en excéder les bornes. C'est pourquoi on n'y trouvera point d'instructions sur la greffe & la taille, sur la culture de la plupart des Arbres fruitiers, & celle de quelques Plantes, qui demanderoit un long détail. Tous ces sujets sont traités dans des Ouvrages que nous consultons nous-mêmes. Seulement les Fourages & quelques Plantes de grande culture étant une partie très-bornée, nous donnons un précis des façons qu'ils exigent.


En un mot, nous n'avons entrepris que d'indiquer aux amateurs tous les Arbres & toutes les Plantes qui peuvent entrer dans les Jardins d'utilité, de curiosité, & de décoration, les

moyens de se les procurer, & de les cultiver avec succès, & de prévenir les méprises dans les demandes qui nous seront faites, ou dans les envois que nous ferons d'Arbres fruitiers; d'Arbrisseaux & Arbustes; de Plantes utiles ou agréables, tant exotiques qu'indigènes, de pleine terre, d'Orangerie, & de Serre chaude; de jeune Plant, Graines, Oignons, Tubercules de Plantes potagères & de Fleurs; en un mot, de tout ce qu'il y a de plus rare & de plus précieux dans la Botanique & dans le Jardinage, que notre Commerce journalier & nos Correspondances nous mettent en état de fournir.



NOUS prions ceux qui nous adressent des Lettres ou des Envois, de mettre notre Enseigne exactement telle qu'elle est au frontispice de ce Catalogue.

Ceux qui nous demanderont des Arbres fruitiers, voudront bien expliquer sur quels sujets ils les desireront, ou marquer la qualité & la profondeur de leur terrain, afin que nous les fournissions greffés sur les Sujets convenables.





*TEMs propre à semer la plupart des
Graines mentionnées dans ce Catalogue.*



Semences de la Saint-Jean.

Dès que le solstice d'été est passé, on commence à songer à la recolte de l'année suivante. On sème à la fin de Juin les Choux frisés-poin-tus, pour les avoir de primeur au printems.

Juillet.

On sème en Juillet des Carottes & Panais pour passer l'hiver; de la Raiponce comme en Août; dans les terres fortes, de l'Oignon blanc pour replanter en Octobre; dans les terres légères, on ne le semera qu'en Août.

Au vingt de ce mois, semer un peu de Choux-fleurs pour passer l'hiver. On peut semer aussi du Cheruis, de la Scorfonnaire, &c.

Semer à l'abri diverses fleurs, pour les repiquer au printems & fleurir au commencement de l'été suivant, sçavoir:

La Nigelle, le Tharaspic d'été, le Sain-foin

d'Espagne, la Delphinette ou Pied-d'allouette vivace, la Pyramidale, l'Œillet de Poëte, la Digitale, dès qu'elle est recueillie, les Passe-roses, &c.

Semer dans des caisses de terre légère, les graines de Tulipe, pour les mettre à l'abri de l'hiver; de la graine d'Anémone, qu'on mêle avec du sable sec, l'arroser peu & souvent. Semer, aussi-tôt que recoltée, la graine de Ciclamen dans des pots ou caisses.

Planter les oignons de Lis, Martagons, de Couronnes impériales, de Narcisses, de Belladone, & autres plantes bulbeuses, qu'on ne doit pas garder hors de terre.

Après le quinze, marcotter les Œillets; écussonner sur Prunier, Coignassier, Aubépine, Poirier, Pommier.

Août.

Dès le commencement d'Août, & successivement pendant tout ce mois, il faut semer un peu de Choux d'Yorck & de Choux Pain-de-sucre; pour les planter dès Octobre au pied d'un mur comme les Laitues d'hiver, mais un peu plus espacés; en Mars ou Avril on les lie comme une Romaine; on en jouit à la fin d'Avril ou en Mai.

On sème de la Poirée qui se trouve très-hâtive au printems; mais elle est délicate à la

gelée ; de l'Oseille , du Persil , du Cerfeuil , des Carottes.

On élève du plant de diverses Laitues à planter sur couche en hiver , & en terre à bonne exposition ; sçavoir , Laitues Cocasse , d'Italie , Coquille , Crêpe , & Romaine d'hiver.

On sème encore , mais moins bien qu'en Juin & Juillet , de la graine de Raiponce mêlée avec de la terre ou du sable bien fin , dans une terre bien préparée , où l'on semera en même tems des Radis , pour que l'ombre que leurs feuilles donneront à la Raiponce l'empêche de brûler , si le soleil étoit ardent.

Semer des Choux Pommé-hâtif , Frisé-hâtif , de Bonneuil , d'Alsace & de Milan , pour planter après l'hiver & cueillir en Mai & Juin ; du Chou-fleur dur pour deuxième fois , que l'on conserve dans la serre en baquet , ou en pépinière en bon abri , & des Brocolis à replanter en place au printems.

On sème encore des Navets pour ensabler en Novembre dans la serre , ou les couvrir dehors.

Dans les terres légères , semer l'Oignon blanc hâtif & de la Ciboule. A la fin d'Août , de la Mâche , de l'Epinard , du Cerfeuil.

Semer , mieux qu'en Septembre , diverses fleurs pour fleurir en place dans l'été suivant , comme Pavots , Pieds-d'allouette , Coquelicots , Tharaspics de diverses couleurs , &c.

Semer de la graine des diverses Fraises , à cinq à six pieds d'un mur du Nord ou du Couchant sur un bon labour, terre fraîche bien dressée, couverte de deux lignes de sable & terreau tamisés, ne couvrir la graine que très-peu de ce même mélange, la sarcler très-soigneusement, & l'attendre un mois, quelquefois plus.

Semer les graines d'Anémones, comme on le voit indiqué dans le mois précédent, de la graine de Renoncule qu'il faut couvrir très-légerement de terre ou terreau bien passé.

Planter les Anémones & les Jonquilles simples, la Renoncule-pivoine pour fleurir l'hiver.

Planter aussi les Jacinthes communes, blanc de montagne, de Vitry, Passe-tout, &c.

Semer la graine de Jacinthe.

Marcotter, mieux qu'en Juillet, les Œillets qui s'enracinent facilement.

Ecussonner sur Cérifier, Merisier, vieux Pêchers & Amandiers.

Septembre.

On peut encore semer en Septembre presque tout ce qui a été indiqué pour les deux mois précédents, & en outre des Radis noirs pour tout l'hiver; des Panais & Carottes pour Avril, Mai & Juin : il est plus sûr de les semer en Août.

Planter les Fraisières, si on veut en jouir l'année suivante. *Voyez plus bas en Novembre.*

Semer les petits Pois, & Haricots de Hollande à bouquets, pour les mettre sur des couches chaudes sous chassis quand le tems devient rude.

Semer de la Quarantaine pour repiquer de bonne heure; même de la grande Giroflée, en terre sèche, mêlée de décombres de chaux, suivant Bradley. La Quarantaine Royale se peut semer en Août, & même dès la fin de Juillet.

On peut semer encore des Anémones, Renoncules, & autres graines de plantes bulbeuses ou à tubercules. On fait qu'elles demandent de grands soins en hiver contre les pluies, la neige & le givre.

Planter des Renoncules, des Anémones, des Narcisses de Constantinople & autres de toutes espèces, même des Jacinthes, des Jonquilles & des Tulipes à la fin du mois.

Dans certaines terres tardives, ces premières plantations plus hâtives ont en hiver plus besoin d'être garanties des intempéries.

Mettre les Oignons en caraffes pour fleurir l'hiver, comme Narcisses doubles de Constantinople, Narcisse blanc, Soleil d'or de Hollande, & les Jacinthes de toutes espèces, même des Jonquilles.

Vers le quinze, écussonner les jeunes Pêchers & Amandiers.

Octobre.

Dans le mois d'Octobre, on risque encore à diverses fois la Mâche & l'Epinard pour le Carême; le Cerfeuil pour le printems.

On fait la seconde semence de divers plants qui portent le nom de la *Saint-Remi*, comme Laitue-Crêpe, de la Passion, Coquille, Gotte, & Romaine hâtive pour replanter; Choux pommés, frisés-hâtifs, & Choux-fleurs durs à repiquer à l'abri sous cloche & couverts de litière. Commencer à semer des Pois-michauds au pied des murs à bonne exposition.

Les curieux de Nouveautés, qui veulent, à force de dépense, manger des Concombres en Avril, commencent à les semer en pleine terre pour les transplanter en pots, afin de les mettre d'abord à couvert des nuits fraîches, puis sur les couches chaudes sous chassis, quand il sera besoin.

Ils sement aussi des Pois-nains; & dans des paniers bien exposés au midi, des Haricots que l'on destine à être mis en serre les nuits, puis sur les couches chaudes à l'arrivée des tems rudes.

Planter des œilletons d'Artichauds pour le printems, les arroser peu. Rarement cette plantation trop tardive réussit.

Dans ce mois, on commence à planter tou-

tes les espèces d'arbres fruitiers & autres ; & on continue jusqu'au printems dans les tems favorables.

Il faut aussi semer l'Immortelle & autres fleurs annuelles qui résistent au froid.

Planter des Jacintes de toutes espèces, Narcisses, Jonquilles, Tulipes, Anémones, Renoncules, &c.

Novembre.

On fait à la Toussaint, sur les nouvelles couches, les premières semences de Laitues & de Radis, de Cresson, &c.

L'Asperge se sème en automne avec plus de succès qu'au printems.

On sème dans les terres fortes des Pois mi-chauds aux côtières bien terreautées de gadoue & de fiente de Pigeons.

Planter dans la cave les racines de Chicorée sauvage pour blanchir, comme il sera expliqué à l'article CHICORÉE.

On sème le fruit de l'Amandier, les noyaux de Prunes, de Pêches, au pied des Espaliers pour greffer en place.

On enterre diverses graines d'arbres à trois pieds en terre, où, à l'abri de la gelée, elles se façonnent & se disposent à mieux germer, comme celles d'Aubépine, de Sicomore, de Frêne, Alizier, Azerolier, Orme, Troëne,

Tilleul de Hollande, Laurier, Houx, If, Pin, Pin de Hollande, Sapin, Sapin de Piémont, &c. &c. dont la plupart font dix-huit mois à lever, & par conséquent ne feront semées que de Février ou Mars suivant en un an.

On plante les Oignons de Tulipes, d'Ornitogales, de Narcisses de Constantinople, les Semidoubles, les Anémones, Jacinthes & autres, s'il en reste; & ces Oignons plus tardifs résistent mieux aux froids.

On commence à tailler les Poiriers & les Pommiers, surtout les jeunes, & ceux qui ne promettent point de fruit.

Décembre.

On sème sur les couches de Décembre des Radis & Raves, des Salades, du Cresson & de la Montarde pour fourniture; des Concombres; mais il faut bien de la surveillance pour faire réussir cette culture dans un temps où l'on ne peut donner aux plantes l'air si nécessaire à leur végétation, sans introduire un froid humide qui contrarie beaucoup la température artificielle des fumiers chauds.

On sçait qu'alors les couches doivent être fort étroites, afin que la chaleur des rechaufs dont on les entoure, puisse pénétrer jusqu'à leur centre.

On peut planter des Renoncules, Anémo-

nes , Tulipes , & tous les autres Oignons qu'on n'a pas été à portée de planter auparavant.

On continue à tailler les Poiriers & les Pommiers.

A la fin de ce mois ou au commencement de Janvier , préparer pour être semés au printemps les Noyaux de Pêches , de Prunes , d'abricots , de Cerises , de Merises , les Amandes , Noix , Glands , Faines , &c. Mettre dans un vaisseau proportionné à la quantité de semences , un lit de terre ou sable frais & humide , & non mouillé , épais de deux ou trois pouces ; mettre dessus un lit de Noyaux ; couvrir celui-ci d'un nouveau lit de terre ou de sable ; étendre dessus un nouveau lit de semences ; & ainsi alternativement. Renfermer ce vaisseau dans un lieu à couvert de la gelée ; ou le placer au pied d'un mur au midi , & le couvrir pendant les gelées. Vers la fin de Février , si ces graines ne commencent pas à germer , jeter un peu d'eau dans le vaisseau , pour humecter tout ce qu'il contient. En Mars ou Avril , lorsqu'elles seront germées , les retirer du sable avec précaution , & les planter en rayons.

Janvier.

Le Soleil monte au mois de Janvier , & commence en quelque sorte , avec la nouvelle année , un nouvel ordre de végétation : les

boutons des arbres se gonflent, quelques-uns s'entr'ouvrent ; tels sont ceux des chatons du Peuplier-Tremble, du Noisetier & autres.

Toutes les semailles des mois précédents, dont l'approche de l'hiver ralentissoit la venue, annoncent, dès qu'il est arrivé, le prochain renouvellement de la Nature. Aussi devient-il plus aisé de faire de nouvelles semailles de primeur, en usant des mêmes secours qu'en Décembre, c'est-à-dire, des couches chaudes, des châlis vitrés, & des couvertures de litière.

On sème donc la Laitue à couper, dite Petite Laitue, la Chicorée sauvage & les Fournitures, le Nasitor, le Pourpier vert, la Pimprenelle, la Corne de Cerf, le petit Céleri, les Radis & petites Raves de primeur, de la Carotte jaune-courte, si l'on veut : on élève du plant de Laitues Crêpes, Gotte, de Versailles ; de Romaines ; de Céleri pour repiquer sur couche ; de Choux Pommé-hâtif, de Bonneuil, d'Alsace, de Chou-fleur d'Angleterre, de Chou-fleur tendre, de Brocolis blanc & violet ; enfin les Melons & Concombres de primeur, qu'il faut replanter tous les quinze jours, pendant deux mois, sur de nouvelles couches.

Semer, avec les soins recommandés, des Pois hâtifs & Haricots en bonne exposition. Si le tems est favorable, on plante des pattes d'Anémones & des griffes de Renoncules, même divers Oignons, s'il en reste.

Février.

Si la terre n'est ni gelée, ni couverte de neige, on continue à semer sur couche les petites Salades & leurs fournitures, les Radis, mêlés, si l'on veut, de Carottes, de Navets & de Panais. Dans les terrains chauds, on sème les Oignons de primeur, le Poireau, la Ciboule, des Pois, des Fèves de marais; semer du Persil; risquer la Scorfonnaire, les Cheruis, pour les replanter lorsqu'ils ont deux pouces de longueur: ils en viendront beaucoup plus beaux.

Semer sur une couche fort drus des Pois-Michauds, pour replanter sur une autre couche, en Mars; des Haricots & Pois sur couche en mannequin, pour les remettre en terre & succéder aux autres. Semer sur les couches, dont la chaleur se passe, du Chou-fleur, Brocolis, Chou pommé, Chou de Milan, Chou d'Angleterre en pain-de-sucre, pour les avancer & replanter au mois de Mars en place.

On élève aussi sur couche du plant de Chicorée & de Scarole pour l'été, des Laitues Gotte, Brune, Mousserone, Crêpe, sur-tout des Laitues Hollandoise & de Versailles, qu'on repique en place en pleine terre; élever aussi du plant de Romaine.

Planter en terrain léger de l'Echalotte, de l'Ail & de la Rocambole.

Commencer à planter des Pommes de terre & des Topinambours.

Semer sur couches, sous chassis, des Melons & Cantaloups qu'il faudra replanter deux fois sous cloche ou chassis.

Vers le quinze, commencer à tailler le Pêcher, l'Abricotier, le Cérifier, le Prunier, le Groseillier; rabattre une partie des Framboisiers & des Groseilliers, pour leur faire pousser du bois nouveau.

Sur la fin du mois, semer des Melons maraîchers & autres tardifs que l'on ne replantera qu'une seule fois, & des Concombres.

Semer de la graine d'Asperges en pleine terre.

Dans la fin de ce mois ou dans celui de Mars, greffer en fente.

Semer toutes sortes de graines d'Arbres, Arbrisseaux, & Arbustes, préparées comme il a été dit ci-devant.

Tailler la Vigne.

Planter toutes les espèces d'Arbres à fruits, d'Arbres de forêt, & toutes les espèces d'Arbustes qui s'accoutument de notre climat.

Continuer de planter des Anémones & Renoncules.

Semer des graines d'Auricules dans des caisses de terre légère, mêlée de bois ou de feuilles pourries; les mettre à l'ombre, & arroser peu & souvent; des graines de Prime-vère, fort épais, dans une cote au Nord.

Semer les Fraïses , si on ne l'a pas fait en Août.

Semer sur couche des Basilics & plusieurs fleurs d'été , Tricolor , Ambrette , Amarante , Roses-tremières , Campanule , Œillet de poëte , Giroflée , Quarantaine , Tharaspic , &c. en place , Pied-d'allouette , Pavots , Coquelicots , Belle-de-jour , Nigelle de Damas , &c.

Semer les pepins d'Orange & de Citron. Faire des boutures de toutes nos espèces d'arbustes.

Mars.

Les semences de Février se répètent en Mars sur de nouvelles couches , soit pour l'usage , soit pour remplacer le plant qui auroit manqué , ou pour y succéder.

Ce mois est celui où l'on sème le plus de Verdures , de Racines & autres Légumes en pleine terre : l'Arroche , la Poirée , l'Oseille , la Carotte , le Panais , le Navet printannier , les différens Oignons , les Raves & Radis , quelques Scorfonnaires & Salsifis ; enfin Epinard , Cerfeuil , Cresson , Coronope ou Corne-de-Cerf , Capucines , Pourpier , &c.

Elever différentes Laitues & Romaines , du Chou-fleur tendre , du Cardon.

Planter des Pois , des Fèves de marais grosses & petites , & risquer quelques Haricots.

Semer des Asperges en pleine terre , & planter les racines qui se vendent au cent.

On élève sur couche le Chilé ou Poivre long, la Nigelle épicée, le Melongène, la Moldavique qu'on destine à être placée sur couches ou sur des ados de terreau; on y sème aussi les Pervenches-roses, la Sensitive, la Glaciale, le Camara, pour les élever en pots, de même que les Tubéreuses doubles & simples qu'on y plante en pots.

Les fleurs d'automne se sement au pied d'un mur au Midi dans du terreau, la Balfamine, les Reines-Marguérites, le Souci, les Amaranthoïdes, les Passevelours, les Roses & Œillets d'Inde, les Merveilles ou Belles-de-nuit, l'Œillet de la Chine, le Liseron des Indes, & la Belle-de-jour en place.

Séparer & replanter les Pâquerettes, les Hépatiques, les Juliennes doubles, Œillets d'Espagne, Lichnis ou Croix de Jérusalem, Boutons-d'or, Campanules doubles, &c.

Replanter le Baume, le Thim, la Lavande, le Romarin, l'Hissope, &c.

On fait en ce mois les semailles de Soucrion; du Froment de Smirne, mieux en automne; des Prairies artificielles; ainsi que de tout ce qu'on nomme *les Mars*.

Achever les plantations d'Arbres & d'Arbustes, si elles ne le sont pas; & la taille des Arbres fruitiers.

On fait les plantations de la plupart des Fraisières, pour produire dans les deux années

suivantes seulement, & non dans la même année ; excepté celui des Alpes , qui , bien cultivé & arrosé , rapporte beaucoup en automne.

Avril.

On greffe en Couronne aussi-tôt que les Sujets sont assez en sève.

On sème la Scorsonnaire , le Salsifi & les Betteraves. Ces Racines tendres à la gelée , semées précédemment , pourroient être péries.

On sème de la Poirée blonde à replanter pour manger en cardes ; la Chicorée sauvage pour blanchir l'hiver ; les Cardons d'Espagne & de Tours dans les terrains chauds , ou en petits pots sur couche.

On sème mieux qu'en Février les graines de Pins , Sapins & autres Conifères.

On sème les Pois-goulus , nains & à rame , le Pois quarré-vert pour faire sécher , & d'autres espèces ; des Fèves de marais. On commence les semailles de Haricots. Il est bon de semer une partie de ses Giraumons , Potirons , Pépons , Pastissons , Cougourdettes , &c.

On sème des Epinards à l'ombre , des Laitues pour pommer , comme Versailles , Mousferonne , Italie , Royale , Batavia , &c. des Romaines. Semer sur terre en bonne exposition du Pourpier doré , du Céleri , de l'Oseille , soit en planche , soit par rayons , des Raves , des Ra-

dis, blancs, rouges, & des petits Radis gris; du Cresson, de la Chicorée sauvage; du Persil, &c. On continue de semer les Choux-fleurs & sur-tout le dur.

On peut semer encore de l'Oignon, de la Ciboule, du Poireau, enfin tous les légumes qui auroient manqué, ou qu'on n'auroit point semés dans le mois précédent.

Planter les Asperges & regarnir celles qui paroissent avoir manqué; planter des Artichauts.

On continue de semer encore toutes les espèces de graines de Fleurs annuelles; mais on élève sur-tout diverses espèces qu'on ne pouvoit encore semer en Mars, au moins sans chassis, le Réséda, les Roses & Œillets d'Inde de différentes nuances, les Merveilles, le Séneçon d'Afrique, les Scabieuses, les Ancolies, &c. On sème aussi des Passe-roses.

On plante encore des Tubéreuses doubles & simples, l'Œillet d'Espagne, l'Œillet de poète, la Julienne double, la Croix de Jérusalem, les Renoncules-bassin ou Boutons d'or, &c.

On sème le Maïs, le Panis, & l'on continue à semer des Mars, si on se trouve retardé.

Mai.

On peut encore semer au mois de Mai des Betteraves, de la Scorfonnaire, des Concombres
en

en pleine terre , sur-tout le Cornichon ; du Chou-fleur dur & de celui d'Angleterre , des Cardons de Tours & d'Espagne ; des Laitues pour pommer & des Romaines ; quelques Raves & Radis , de la Chicorée & Scarole , du Pourpier en pleine terre , des Haricots de toutes espèces & des Pois sans pareils , Anglois , de Marli , de Clamart , quarrés blancs , & au cul-noir , &c.

On sème le Chanvre de Piémont , ainsi que le Commun , & le Sorgo.

On ébourgeonne les Arbres taillés & la vigne ; & on greffe en flûte. On finit d'œilletonner & planter les Artichauds.

On peut semer encore quelques graines de Fleurs d'automne , Quarantaine , Nigelle , Tharaspic , Doucette ou Miroir de Vénus , Delphinette , &c. C'est le meilleur temps pour semer celle d'Œillet. On sème des Giroflées pour le printemps suivant.

Juin.

Avant le 10 de ce mois , on pince les gros bourgeons des Figuiers.

L'été est le temps de la récolte ; il n'est plus guère question de semer ni de planter ; on sème cependant encore en Juin, dans les parties à mi-ombre, des Epinards & des Fournitures, mais ces semences hebdomadaires n'ont qu'une coupe.

On sème la grosse Rave, le Radis long, le petit Radis noir & le gros, de la graine de Raponce, comme en Août, en l'arrosant souvent; on sème des Laitues pour pommer & des Chicorées, des Haricots-Suisses, des Pois-Michauds, & au cul-noir pour les derniers.

Après Juin jusqu'à l'hiver, outre les semences qu'on a vu plus haut qu'il falloit faire en avances pour l'année suivante, on en fait encore d'autres, dont on est payé sur le champ; telles sont les semences hebdomadaires, c'est-à-dire, les Fournitures de Salade, l'Epinard, les Radis, les Raves, les Navets & Radis gris; on élève encore du plant de Laitues & de Chicorée, & même diverses graines légumineuses, comme Haricots, surtout les Suisses, Pois-Michauds, Marli, Quarré blanc, cul-noir, &c. Car, quoique rien de ce qu'on sème après le Solstice d'été n'amène les graines à maturité; comme on se contente ici de ces graines vertes, on peut en faire la récolte.

Enfin ceux qui ne craignent aucunes dépenses pour se procurer des raretés, sement au commencement de Juillet des Concombres, dont ils recueillent les fruits, à force de fumier, en Décembre & Janvier.

On observera que pour la dernière semence de Pois à faire en Août, on choisit le plus hâtif, qui est le Michaud: en effet, il n'y a pas de tems à perdre, & les graines les plus hâtives réussissent toujours plus difficilement sur le déclin de

la campagne , qu'elles n'auroient fait au commencement lorsque chaque jour amene du changement en mieux ; au lieu que dans l'automne on ne peut s'attendre que d'aller de pis en pis.

Nota. 10. Les bornes d'un Catalogue ne nous permettent pas de faire le détail des attentions nécessaires pour la récolte & la conservation des graines , & pour les empêcher de varier & de dégénérer. Mais nous observerons qu'il faut très-peu recouvrir les graines sur-tout dans les terrains forts ; qu'il vaut mieux répandre du terreau dessus ; ou bien si les graines sont très-fines, & le Semis peu étendu, tamiser par dessus un peu de terre en poussière, & couvrir de mousse. Des graines trop enterrées , il ne leve qu'une très-petite partie ; elles sont long-temps à lever, & ordinairement le plant est foible.

20. Au printems & en été , il faut semer à l'ombre toutes les graines de Choux , Raves , Radis , Navets , Cressons , Roquette , &c. cribler dessus de la cendre , ou de la fuye , & leur donner fréquemment de légères mouillures pour les garantir du petit puceron ou puce de terre qui coupe les germes naissans , ou dévore les cotiledons. Nous recevons souvent des reproches sur les graines , qui ne sont dûs qu'à la négligence ou l'ignorance de ceux qui les se-

ment, ou aux défauts des terres & des expositions où elles sont semées.

30. Tous les semis du printems & de l'été, sur-tout dans les terres fortes, doivent être garnis de terreau ou au moins de fumier court (ce sont les parties grossières du terreau, ou les pailles très-courtes qu'on retire des bords & des sentiers des couches, ou des tas de fumier consommé) ou d'un peu de mousse, pour les préserver du hâle & de la sécheresse, & les empêcher de se gerfer & de se durcir & croûter.

40. Si l'on n'a point de couches, il faut repiquer les jeunes plantes délicates en terre douce, amendée, & bien exposée; & les lever en motte, autant qu'il est possible, lorsqu'on veut les mettre en place.

50. Dans les terrains infectés de courtillières, il faut semer en pots ou en terrines toutes les graines dont on ne fait pas de Semis très-étendus.

60. Si nous ne faisons pas toujours les envois immédiatement après les demandes qu'on nous fait de plants qui se peuvent transplanter depuis Septembre jusqu'en Mars, c'est que nous choisissons les temps doux & propres au transport & à la conservation de nos envois, qui pourroient périr, ou beaucoup souffrir, dans les temps de gelées.





CATALOGUE

DES

GRAINES, BULBES ET PLANTS,

QUI se trouvent chez le Sieur
VILMORIN-ANDRIEUX.

Nota. Les Phrases latines sans citation sont de
M. Linneus : celles qui sont citées J sont de
M. de Jussieu.

I.

Racines, Bulbes, gros Légumes, Salades,
fines Herbes, Plantes aromatiques, Graines
& Fruits de Potager.

ABSYNTHE, *Arthemisia Absinthium* ; plante
moyenne, vivace.

Petite Absynthe, ou Pontique, *Arthemisia
Pontica* ; moindre en toutes ses parties.

Semences, pieds éclatés en mars ; tout
terrein, bonne exposition.

AIL, *Allium sativum* ; pl. bulbeuse vivace.

Ail Rocambole, *Allium Scorodoprasum*.

Bulbes éclatées ; semences & Rocambolles au printems ; tout terrain.

AMBROISIE, Thé du Mexique, *Chenopodium Ambrosioides* ; pl. moy. ann. Semences au printems sur couche.

ANANAS, ~~*Nas pinea Indica*~~ Cette plante exotique, qui dans notre climat ne peut réussir qu'en serre chaude & sous chassis, se multiplie de drageons & de couronnes, qui se plantent en mars & avril.

ANGELIQUE, *Angelica archangelica* ; très-grande plante vivace. Plant : semences peu couvertes ; fin de l'été mieux qu'au printems.

ANIS, *Pimpinella Anisum* ; gr. pl. annuelle, ombelle de petites fleurs blanches. Semences au printems ; bonne terre légère & arrosée.

ARROCHE, Bonne-Dame, *Atriplex hortensis*.

Arroche rouge, *Atriplex hort. rubra*.

Arroche très-rouge ; *Atriplex hort. ruberrima*.

Grande pl. du printems. Semences en mars ; tout terrain.

ARTICHAUD, *Cynara Scolymus*.

Artichaud Vert, grosses têtes vertes.

Artichaud Violet, moindres têtes violettes.

Artichaud Blanc, très-petites têtes blanchâtres.

Artichaud Rouge, très-petites têtes rouge-pourpre.

Grande plante trifannuelle, Cilletons éclatés en mars, avril & mai ; bon terrein engrailé ; arroser ; abriter pendant l'hiver. Semences fin d'avril & pendant tout le mois de mai : en mars & commencement d'avril elles pourrissent au lieu de germer, si la terre n'est pas encore échauffée. Mais on peut les semer dès la fin de février dans de petits pots enterrés dans une couche ; & ne les mettre en place, que lorsque la force du plant & la saison le permettront. Cette pratique est nécessaire dans les terrains froids, ou ravagés par les insectes.

ASPERGE d'Aubervilliers, petite Asperge, *Asparagus officinalis* ; plante vivace. Semences ou jeunes parties en automne ou au printemps en fosses garnies d'engrais.

Asperge de Hollande.

Asperge d'Allemagne, grosse Asperge.

Celles-ci exigent & méritent plus de culture & de façons. Creuser des fosses larges de quatre ou quatre pieds & demi sur une longueur à volonté, de dix-huit pouces de profondeur en terre sèche & légère, d'un pied en terre forte & humide. (Si le terrain est très-humide, creuser davantage les fosses ; garnir le fonds d'une bonne épaisseur de plâtras, décombres, écailles d'huîtres, ou de gazons, ou de jonc marin, ou d'autres matières grossières propres à tirer

l'humidité). Laisser entre chaque fosse un intervalle de trois ou quatre pieds ; garnir les fosses d'environ un pied de fumier , ou mieux de gazons pourris , de boues de rues , ou autres bons engrais ; le bien marcher de bout en bout ; le couvrir de trois pouces des terres sorties de la fouille , amendées si elles ne sont pas de bonne qualité , sans pierres ni matières grossières. Au printems ou en automne , étendre sur chaque fosse deux ou au plus trois rangs de jeunes pattes d'un ou deux ans , à dix-huit ou vingt pouces l'une de l'autre , & jeter dessus trois autres pouces de terre ; ou bien , dans les mêmes saisons & à la même distance , faire de petites fosses d'un ou deux pouces de profondeur , semer dans chacune deux ou trois graines d'Asperges , les couvrir d'un pouce de terreau : lorsque le jeune plant sera fortifié vers la fin de mai , laisser le plus beau pied dans chaque place , arracher les autres. Pendant l'été sarcler , biner , arroser : en novembre suivant , charger encore les fosses de trois pouces de terre ; au printems , un petit labour ; pendant l'été , sarcler , biner , arroser ; l'automne suivant , couvrir les fosses d'un ou deux pouces de bon fumier , & le laisser découvert pendant l'hiver ; à la mi-février suivant , jeter encore trois pouces de terre sur ce fumier ; au printems , cou-

per les plus belles Asperges; au mois de novembre, couper toutes les tiges, retirer trois pouces de terre & la jeter sur les intervalles ou ados; au mois de février, donner un petit labour & rejeter ces trois pouces de terre sur les fosses; biner & sarcler pendant l'été. Donner tous les ans les mêmes façons; de sorte que les pattes seront couvertes de six pouces de terre pendant l'hiver, & de neuf pendant l'été: fumer tous les deux ans, comme il vient d'être dit, avec des engrais doux & bien consommés.

AUBERGINE, Voyez MELONGENE.

AURONNE, Citronnelle, *Arthemisia suaveolens*; plante vivace propre pour bordures. Marcottes & boutures: automne & hiver.

BASILIC (grand) *Ocimum Monachorum*.

Basilic à feuille d'Ortie, *Ocimum Basilicum*.

Basilic à feuille de Laitue, *Ocimum Basilicum bultatum*.

Basilic à feuille de Chicorée, *Ocimum Basilicum fimbriatum*.

Basilic d'Egypte à odeur de Fenouil, *Ocimum Basilicum Ægyptiacum*.

Petit Basilic, Basilic fin, *Ocimum minimum*.

Petit Basilic violet.

Plantes moyennes annuelles. Semences en mars sur couche; en pleine terre en avril.

BAUME, *Mentha hortenensis*.

Baume violet.

Baume vert.

Baume panaché de violet.

Baume citronné, à feuille d'Ortie.

Pl. basse vivace. Semences ou drageons
au printems, en terre fraîche & légère.

BETTERAVE, *Beta vulgaris*.

Betterave (grosse) rouge.

Betterave jaune.

Betterave blanche.

Betterave (petite) rouge, ou de Castelnau-dary.

Grande plante annuelle. Semences en
mars; bon terrain gras, meuble, labouré
profondément.

BLED de Turquie, Maïs, Bled d'Inde, *Zea
Mays*; grande plante annuelle. Semences
en avril, bon terrain.

BOURRACHE, *Borrago officinalis*; fleur bleue.

Bourrache, fleur blanche.

Grande pl. ann. Semences tous les mois.

BUGLOSSE (grande) *Anchusa officinalis*; gran-
de plante vivace. Semences & drageons en
mars; tout terrain.

CAMOMILLE Romaine, *Anthemis nobilis*; pl.
vivace; odeur agréable. Traces; pieds sépa-
rés.

CAPUCINE (grande) *Tropæolum majus*.

Capucine petite à fleur jaune. *Tropæolum mi-
nus*.

Semences en mars sur couche; plus tard

en pleine terre ; pied des murs , ou abri ; bonne terre , arrosements ; propres à couvrir des murs ou des treillages. Le bouton confit au vinaigre sert aux mêmes usages que les Câpres.

Capucine à fleur double. Boutures peu mouillées , sur couche au premier printems ; dans de vieux terreau , ou en pleine terre en mai , à l'ombre. Peut se planter en pleine terre à bonne exposition ; y fleurit beaucoup. Ne peut passer l'hiver qu'en serre chaude.

CARDON de Tours (épineux à tête pleine) ,
Cynara Cardunculus.

Cardon d'Espagne (creux , sans épines).

Très-grande plante annuelle. Semences en pleine terre à la fin d'avril en petites fosses remplies d'engrais ; arrosements. Plus tôt sur couches , ou mieux en petits pots enfoncés dans une couche. Les Semis trop hâtifs , tant sur couches qu'en pleine terre , sont sujets à monter : les empailler en automne ; les mettre dans la serre lorsque les gelées sont à craindre.

CAROTTE , *Daucus Carota.*

Carotte jaune.

Carotte rouge.

Carotte blanche.

Plante basse annuelle. Semences peu couvertes en bonne terre légère en mars ; en terre forte , à la fin d'avril ; à la fin d'août &

en septembre , pour le printems ; couvrir de litière dans les fortes gelées.

Carotte courte hâtive , très-bonne : sur couches & en pleine terre , l'automne & l'hiver.

CELERI, *Apium grave olens*.

Céleri plein.

Céleri couleur de rose.

Petit Céleri de Paris à couper.

Céleri-rave.

Grande plante annuelle. Semences sur couches depuis janvier jusqu'en mai ; en pleine terre en mai & juin ; repiquer en bon terrain ; mouiller souvent. Couper assez près la grosse racine du Céleri-rave en le replantant , le chauffer un peu lorsqu'il commence à grossir , le biner & arroser souvent.

CERFEUIL commun, *Scandix Cerefolium* ; pl. moyenne annuelle. Semences tous les quinze jours , ombre , humidité.

Cerfeuil musqué, *Scandix odorata* ; vivace. Jeune plant d'un an planté au printems ; semences en mars qui ne levent que l'année suivante ; mieux récemment recoltées , elles levent au printems suivant.

CHERUIS, *Sium sisarum* ; petite pl. vivace. Semences en mars , trempées cinq ou six jours dans de l'eau de pluie entretenue dans une tiédeur douce ; semées par rayons en mars sur du terreau fin de vieille couche , recouvertes de même terreau & d'un peu de

fumier court; mouillées légèrement & souvent; difficiles à lever: mieux petites racines, ou têtes des grosses racines plantées au printems; réussit mal en terre sèche ou pierreuse.

CHICORÉE, *Cichorium endivia*.

Chicorée de Meaux.

Chicorée fine d'Italie.

Chicorée Scarole.

Petite plante ann. Semer (peu) en mars, avril & mai.

Chicorée Sauvage, *Cichorium intibus*.

Chicorée Sauvage panachée.

Plante vivace. Semer tous les quinze jours pendant toute l'année sur couche ou en pleine terre, pour l'avoir toujours tendre en petite salade; arroser souvent.

Ces premiers semis de toutes les Chicorées & Scaroles sont fort sujets à monter; ceux de juin, juillet & août sont les meilleurs.

UN des meilleurs expédiens pour faire blanchir de la Chicorée Sauvage pendant l'hiver & l'automne, est de prendre un tonneau enfoncé par un bout; percer le fond de quelques petits trous; environ trois pouces au dessus du fond, faire tout autour du tonneau des trous à peu près de la grandeur de celui du bondon, (afin qu'on puisse y faire passer plusieurs pieds de Chicorée)

aussi près les uns des autres qu'on pourra ; deux ou trois pouces au dessus de ce rang de trous en faire un second ; ensuite un troisième , un quatrième , &c. jusqu'au haut du tonneau. En novembre ou décembre, placer debout ce tonneau dans une cave ; le garnir, jusqu'à la hauteur du premier rang de trous, de terre sablonneuse légère, plutôt fraîche que mouillée, où mieux de terreau ; sur ce lit placer des racines de Chicorée semée au printems, de sorte que le collet soit vis-à-vis des trous ; les recouvrir d'un second lit de terre ou terreau jusqu'à la hauteur du second rang de trous, y coucher de même des racines de Chicorée ; & ainsi de suite. Lorsque le tonneau sera garni, donner une mouillure, qui ordinairement suffit pour tout l'hiver. La Chicorée pousse & fournit abondamment presque tout l'hiver.

CHOU-POMME d'Yorck, le plus hâtif, *Brassica oleracea capitata præcox*.

Chou hâtif en pain de sucre, Chou pointu, Chou chicon.

Chou de Bonneuil.

Chou de Saint-Denis.

Chou de Hollande, très-grosse tête plate.

Chou d'Alsace, de la seconde & troisième saison ; & autres variétés du même pays.

Chou d'Allemagne, tardif, le plus gros des Choux-pomme.

Ces Choux-pomme rangés ici dans l'ordre fuccessif de leurs productions , (supposé qu'ils soient semés en même tems) peuvent être semés tout l'hiver sur couches , ou à de bons abris ; mieux en août & septembre , pour être piqués en pépinière l'automne , & mis en place au printems ; les grosses especes espacées de trois ou quatre pieds en bon terrain , & rechauffées. On peut planter en place avant l'hiver les variétés les plus hâtives.

CHOU de Milan , ou frisé & pommé hâtif , petit , fort bon. *Brassica oleracea capitata Sabauda*.

Chou de Milan de la seconde saison.

Chou de Milan de la troisième saison.

Chou de Milan ordinaire.

Chou de Milan à tête longue.

Chou de Milan doré.

Chou frisé d'Allemagne à très-grosse tête.

Chou Pancalier frisé & pommé de Touraine.

Ces Choux se sement depuis la fin de l'hiver jusques vers la fin d'avril. On peut semer un peu des hâtifs avant l'hiver. Les quatre dernières variétés résistent long-tems en hiver.

CHOU-POMME rouge , *Brassica oleracea capitata rubra*.

Chou-Pomme rouge d'Allemagne.

Chou-Pomme rouge de Hollande , petit , fort bon , tardif.

Semer en hiver ou dès le commencement du printems sur couche ou à l'abri. Le dernier se sème bien en août.

Chou vert frisé d'Allemagne, *Brassica oleracea viridis*.

Chou frisé rouge, *Brassica oleracea rubra*.

Chou panaché ou tricolor frisé, *Brassica oleracea Sabellica*.

Chou blond, & vert à large côte, très-bon.

Chou Cavalier, *Brassica oleracea sylvestris*.

Chou vivace, *Brassica oleracea semper vivens*.

Se sement en mars, avril, mai; fort bons pendant l'hiver, lorsque les feuilles ont été attendries par les gelées. Le Chou Cavalier préférable, n'ayant point goût de musc. Il peut se semer en juillet ou août: pendant tout l'été on cueille ses feuilles pour nourrir les vaches & les cochons; il s'élève fort haut.

Le Chou Pancalier, le vrai Chou de Hollande, le Chou d'Espagne, *Brassica oleracea Selenisia*; mêmes qualités, même culture.

CHOU-RAVE ou de Siam, blanc, *Brassica oleracea Gongylodes*; & le violet. Tige enflée comme une très-grosse pomme. Semer dès le commencement de mars, jusqu'en mai; les manger à demi grosseur pour être tendres. Ceux des derniers semis, qui ne se recueillent qu'avant les gelées, sont rarement durs.

CHOU-NAVET,

CHOU-NAVET, *Brassica oleracea Napo-Brassica*; racine formant une grosse bulbe : se cultive comme le précédent.

CHOU-FLEUR dur, *Brassica oleracea botrytis*.

Chou-fleur dur d'Angleterre.

Chou-fleur tendre.

Chou-fleur de Malthe.

Chou-fleur de Hollande.

Chou-fleur d'Italie.

Chou-fleur de Chypre.

Semez sur couche en octobre (le tendre en janvier). Repiquez sur couche ; plantez au printems en terrain bien labouré , bien engraisé ; mouillez beaucoup & souvent. Semez en pleine terre en mai. Les durs se peuvent semer en août ou septembre , & repiquer en pleine terre en lieu bien abrité ; ils veulent une bonne terre légère. En terre forte ou froide il est nécessaire pour ceux-ci , & très-bon pour tous les autres qu'on plante au printems , jusqu'à la fin de mai , de les traiter ainsi. Faire un trou d'un pied carré , mettre dans le fond un lit de fumier de cheval bien consommé , & par dessus de bonne terre mêlée en partie égale de terreau de vieilles couches ; y planter un Chou ; garnir le dessus d'un peu de fumier court. Il est même plus sûr , dans ces terrains , au printems de repiquer deux fois le Chou-fleur , pour l'arrêter & l'empêcher de monter.

Voyez pour les Semis de toutes sortes de Choux, le *Nota* 2^o. page 19.

CHOU-BROCOLI violet commun.

Chou-Brocoli violet de Malthe.

Chou-Brocoli blanc d'Angleterre.

Ce Chou, qui paroît une variété du Chou-fleur, donne sous chaque feuille, & à l'extrémité de la tige, des drageons tendres & succulents. Il se sème depuis janvier jusqu'à la fin d'avril; se plante en bonne terre engraisée, comme les Choux-pomme : ou bien il se sème en juin & juillet, se plante avant ou après l'hiver, pour produire en mars ou plus tard. Ce Chou devroit être plus commun. Ceux qui le connoissent, le comparent & même le préfèrent, surtout le blanc d'Angleterre, aux Choux-fleurs, dont il n'exige pas les soins & les façons.

Plusieurs autres variétés de Choux tant curieux qu'utiles.

CIBOULE, *Allium fissile*, J. Petite pl. bulb. bisann. Semences tous les quinze jours depuis mars jusqu'en août.

Ciboule vivace; touffes éclatées au printems.

CIBOULETTE, Cive, Civette, *Allium schenoprasum*; très-petite plante bulbeuse, touffes éclatées en mars.

CITROUILLE, *Cucurbita pepo*; très-grande pl. rampante annuelle; très-gros fruit vert.

Citrouille jaune.

Citrouille grise.

Citrouille jaune-pâle.

Semences en mars & avril, en petites fosses garnies de fumier.

COCHLÉARIA, herbe aux cuillers ; *Cochlearia officinalis* ; petite pl. bisannuelle. Semences printems & été.

CONCOMBRE, *Cucumis sativus* ; pl. moy. ann. rampante.

Concombre jaune.

Concombre hâtif blanc.

Concombre vert, pour cornichons.

Concombre serpent, *Cucumis flexuosus*, pour cornichons.

Culture d'un grand détail. On sème les Concombres pour cornichons en pleine terre à la fin de mai : on les mouille au besoin.

CRESSON Alenois, NASITOR, *Lepidium sativum*.

Cresson Alenois (petit) frisé.

Cresson Alenois (grand), à feuilles d'ortie ou feuilles d'oseille.

Cresson de Para, *Spilantus oleraceus*.

Cresson à fleur rougeâtre, *Spilantus Brasiliensis*.

Petite pl. ann. Semences sur couches pendant l'hiver ; en pleine terre tous les quinze jours, pendant le printems & l'été.

ECHALOTTE, *Allium ascalonicum* ; très-petite

pl. bulbeuse. Bulbes séparées en mars, plantées à fleur de terre.

EPINARD, *Spinacia oleracea*.

Grand Epinard, ou Epinard de Hollande.

Plante moy. ann. Semences depuis mars jusqu'à la fin de septembre ; à l'ombre pendant l'été.

ESTRAGON, *Arthemisia dracunculus* ; petite plante vivace. Pieds éclatés au printems & en automne ; arroséments.

FENOUIL, *Anethum fœniculum* ; grande plante vivace. Semences en mars.

Fenouil doux à faire blanchir, ou Anis de Paris. Semences en mai & juin ; même culture que celle du Céleri.

FÊVE de Marais, *Vicia Faba major* ; grande plante annuelle.

Grosse Fève de Windsor.

Petite Fève Julienne.

Petite Fève naine d'Angleterre.

Fève de Marais toujours verte.

Fève d'Angleterre à cosSES très-longues ; estimée.

Semences en décembre & janvier au pied des murs : depuis février jusqu'à la fin d'avril en bon terrain.

FRAISIER commun des bois, à fruit rouge, *Fragaria sylvestris*.

Fraisier commun à fruit blanc.

Fraisier commun à fleur semidouble.

Fraisier commun sans filets.

Fraisier commun blanc hâtif d'Angleterre.

Plante basse touffue trisannuelle. Pieds éclatés, filets, semences au printems & en automne.

FRAISIER des Alpes, à fruit rouge, *Fragaria sylvestris semper florens*.

Fraisier des Alpes à fruit blanc.

Plante moindre que les précédents; donne du fruit presque tous les mois, s'il est bien cultivé, & renouvelé de graines tous les ans. Semences en pot, terrine, caisse, pleine terre, à l'ombre, en terre douce & très-meuble: enterrer très-peu ou point les graines; couvrir de mousse; mouiller souvent & très-légerement; repiquer en bonne terre non engraisée, à diverses expositions. Les graines fraîches levent en 18 jours; les autres sont lentes à lever. Pour avoir du fruit en hiver, mettre en septembre en chaque pot deux ou trois pieds (suivant leur force) de plant des Semis du printems qu'on aura eu soin d'éfiler pendant l'été. En octobre ou novembre, placer les pots sous des châlis dans des couches de chaleur modérée.

FRAISIER de Bargemont, *Fragaria Cespilini*; plante moindre que le Fraisier des Alpes; peut rapporter deux fois par an; excellent fruit. Semences, & filets.

FRAISIER vert d'Angleterre , *Fragaria viridis* ; de même grandeur que le Fraisier de Bargetmont ; le fruit est rouge-brun & vert-blanchâtre , plein d'eau.

Fraisier - Caperon hermaphrodite , *Fragaria moschata hermaphrodita* ; le plus grand des Fraisiers ; gros fruit de médiocre bonté.

Fraisier-Caperon framboise , bon fruit.

Fraisier-Caperon abricot.

Sont fécondés par l'hermaphrodite.

Fraisier Ecarlate , *Fragaria Americana coccinea* ; grand Fraisier hâtif & propre pour les chassés ; parfum médiocrement bon.

Fraisier Ananas , *Fragaria Americana Ananassa* ; grand Fraisier , gros & bon fruit , d'un parfum très-agréable.

Fraisier de Caroline , *Fragaria Americana lucida* ; un peu moins grand que le précédent , fruit plus coloré & brillant.

Fraisier de Bath , *Fragaria Americana Milleri* ; plus grand que les deux précédents ; fruit plus gros , moins coloré & moins parfumé.

Fraisier du Chili , *Fragaria Chilensis* ; grand Fraisier rarement fertile , s'il n'est fécondé par le Fraisier Ananas ou le Caperon ; la plus grosse de toutes les Fraises , pleine d'eau , peu parfumée.

Fraisier de Versailles à feuille simple , *Fragaria monophylla*.

Fraisier vineux de Champagne.

Fraisier de Mignonne.

Fraisier de la Thuringe.

Fraisier de Lonchamp.

Fraisier nain de Suede, &c.

Plus curieux qu'utiles.

GERMANDRÉE, *Teucrium Chamædris* ; plante vivace pour bordures. Pieds séparés.

GIRAUMON, *Cucurbita Americana*.

Giraumon Pastiflon, *Cucurbita melopepo*.

Giraumon Courge, *Cucurbita lagenaria*.

Giraumon-Turban ; gros, de forme belle & singulière, fort bon frit en pâte comme l'Artichaud.

Giraumon Pastiflon, Bonnet d'Electeur ; forme singulière ; bon, frit de même.

Plantes, les unes grimpantes, les autres rampantes, annuelles. Grand nombre de variétés de Giraumons & Pastiflons, tant utiles que curieuses : même culture que la Citrouille.

HARICOT de Soissons, *Phaseolus vulgaris*.

Haricot blanc sans parchemin, Predome blanc ; petit, excellent.

Haricot jaune sans parchemin, Predome jaune ; mêmes qualités.

Haricot tout-jaune sans parchemin. Toutes les parties de la plante, excepté la fleur, sont jaunes.

Haricot Mignon blanc ; petit, excellent en sec.

Haricot-Pois rouge , Haricot de Prague , sans filets & sans parchemin.

Haricot nain blanc hâtif de Hollande.

Haricot nain blanc hâtif de Laon.

Haricot nain jaune hâtif sans parchemin.

Haricot nain Suisse blanc , rouge , noir , varié , &c.

Beaucoup d'autres variétés tant de nains que de grimpants , de diverses grandeurs , couleurs , qualités. Semences sous chassis jusqu'à la mi-avril ; en pleine terre grasse & bien labourée depuis mai jusqu'en août. Les Haricots rouges , & gris ou variés , sujets à changer de couleur & même de qualité dans les terres chaudes & légères , qui conviennent médiocrement à cette plante.

HERBE DE SAINTE-BARBE , *Erysimum Barba-rea* ; plante moyenne. Semences , boutures & éclats au printems & en automne. Se mange comme le Cresson de fontaine.

HOUBLON , *Humulus Lupulus* ; gr. pl. viv. sarmenteuse. Semences au printems ; racines en hiver. Les jeunes pousses au printems se mangent comme les Asperges.

HYSSOPE , *Hissopus officinalis* : pl. moyenne viv. Semences ou pieds éclatés au printems & en automne.

LAITUE , *Lactuca capitata* : plante basse ann.

Laitue Impériale ou Allemande : fort grosse ; printems.

Laitue Cocaſſe : groſſe ; été , hiver ; terre légère , arroſemens.

Laitue de Verſailles : ſupporte mieux l'hiver.

Laitue Batavia : très-groſſe ; été ; difficile ſur le terrain ; arroſemens.

Laitue Batavia brune , ou Laitue Chou : bonne variété.

Laitue Groſſe rouge : groſſe ; toutes ſaiſons , tout terrain.

Laitue Coquille : ſupporte très-bien l'hiver.

Laitue Paſſion : ſupporte encore mieux l'hiver.

Laitue Groſſe blonde : groſſe & blonde ; printems & automne.

Laitue George : groſſe , tendre ; terrain léger.

Laitue Bapaume : groſſe ; médiocre bonté ; toute ſaiſon , tout terrain.

Laitue d'Italie : moyenne groſſeur ; très-bonne ; terrain léger.

Laitue Hollande , ou groſſe brune : groſſe ; été ; médiocrement tendre.

Laitue Pareſſeuſe : groſſe ; ſemée au commencement de mars , très-lente à monter ; été.

Laitue Royale : groſſe ; tendre ; arroſemens ; été.

Laitue Perpignane : fort groſſe ; tendre ; été ; terrain ſec.

Laitue petite Crêpe : fort petite ; hiver ſur couches ; printems ſous les murs.

Laitue Groſſe Crêpe : plus groſſe ; mêmes ſaiſons & expoſitions.

Laitue Gotte. C'est la meilleure sous cloches ;
bonne sous chassis.

Laitue Verte hâtive de Hollande ; la meilleure sous chassis.

Laitue de Bellegarde ; grosse , tendre , de toutes saisons.

Laitue Dauphine : fort grosse ; excellente au printemps.

Laitue Flagellée : moy. fouettée de rouge ; printemps , & automne.

Laitue Berg-op-zoom : petite ; bonne ; toutes saisons.

Laitue Palatine : semblable à la Berg-op-zoom ; plus grosse.

Laitue Sans-pareille : moy. grosseur ; lente à pommer.

Laitue Moufferonne : petite ; fort tendre.

Laitue Epinard , & Chicorée ; à couper plusieurs fois.

Plusieurs autres variétés.

Les Laitues d'hiver se sement à la fin d'août & au commencement de septembre ; se repiquent en automne le long des murs bien exposés , ou sur des ados bien abrités ; on les couvre de litière dans les grands froids.

LAITUE-ROMAINE , Chicon , *Laëtuca sativa Romana*.

Laitue-Romaine verte : grosse , toute saison , tout terrain.

Laitue - Romaine Panachée : tendre , excellente ; printems.

Laitue-Romaine Blonde : peu arrosée en terre forte.

Laitue-Romaine Brune : fort douce ; hiver , printems & automne.

Laitue-Romaine Grise : très-grosse , bonne , lente à se former , peu sujette à monter dans l'été ; passe bien l'hiver.

Laitue-Romaine Hâtive : ressemble à la Blonde ; hiver sous cloches.

Laitue-Romaine Alfange : feuille très-longue & très-large , jaune & rougeâtre.

Les Romaines d'hiver se sement en même tems que les Laitues d'hiver.

LAVANDE , *Lavandula spica* : pl. moy. viv.

Petite Lavande.

Semences ; mieux pieds éclatés en mars , avril , septembre.

LAURIER FRANC , *Laurus nobilis* : aime les murs à l'exposition du nord.

LENTILLE grande ; blonde.

Lentille à la Reine ; petite , rougeâtre , propre pour les coulis.

Lentille d'Espagne ; sorte de Gesse blanche , assez ressemblante à une petite Fève de Marais ; pl. moy. un peu rameuse ; bonne en vert comme les petits pois.

Lentille de Canada , très petite vesce blanche , bonne pour purées.

Semez en mars & avril. Terrain sec, sableux, sans engrais pour la grande & la petite Lentille.

MACHE, Bourslette, Doucette, *Valeriana locusta*.

Grande Mache d'Italie.

Petite plante basse ann. Semences depuis la mi-août jusqu'à la mi-octobre; bonne terre meuble amendée, arrosements.

MARJOLAINE, *Origanum majorana*: petite pl. vivace; semences, pieds éclatés, au printemps.

MATRICAIRE double, *Matricaria Parthenium multiplex*.

MELILOT, *Trifolium Melilotus*.

Melilot odorant, Baume du Perou, *Trifolium Melilotus cœrulea*.

MELISSE, Citronnelle, *Melissa hortensis*.

Melisse Romaine citronnée, *Melissa officinalis Romana*. J.

Plante moy. viv. Semences, pieds éclatés; au printemps; bon terrain, à l'ombre.

MELON Maraicher, *Cucumis Melo*: brodé; chair rouge, vineuse.

Melon de Coulomiers: le plus gros des Melons.

Melon des Carmes: moyen, peu brodé; chair pâle, sucrée.

Melon des Carmes (petit).

Melon de Langeais: moyen, allongé, à côtes; chair rouge vineuse, sucrée.

Melon Sucrin de Tours : gros , rond , brodé ;
chair rouge , ferme , très-sucrée.

Melon Cantaloup noir , galeux , argenté , &c.
de 30 à 40 variétés.

*Voyez la Taille des Melons à la fin ,
Chap. VII. à la suite des couches pour
Melons , &c.*

MELON d'EAU , Pastèque , *Cucurbita citrullus* :
plante moyenne rampante ann. comme tous
les Melons. Semences sur couche en avril ;
plantés sur couche ou en terre bonne &
grasse ; arroséments.

MELONGENE , Aubergine , Meringeane , &c.
Solanum Melongena : pl. moyenne , ann.
Plusieurs variétés.

Semences sur couches ; planter sur cou-
ches , ou en bonne exposition ; mouiller
souvent. Ses fruits violets , longs ou ronds ,
les longs par préférence , font un plat d'en-
tremets. Etant fendus en deux suivant leur
longueur , & leur pulpe tailladée profon-
dément en tout sens , la couvrir d'une farce
faite de chapelure & de mie de pain , de
fines herbes hachées , de sel , de poivre ,
d'anchois , d'huile ou de bon beurre ; mer-
tre sur le gril ou dans une tourtière ; faire
cuire à petit feu , arrosant d'un peu d'huile
ou de beurre , à mesure que la cuisson s'a-
vance ; servir bien cuit & bien chaud.

MENTHE-COQ , *Tanacetum balsamita*.

Menthe des jardins , *Mentha gentilis*.

Menthe frisée , *Mentha crispa*.

Menthe poivrée , *Mentha piperita*.

MOLDAVIQUE , NEPENTÈS , *Dracocephalum Moldavica* : grande plante ann. Semences au printems ; bonne exposition.

La Recette du Ratafia de Moldavique se trouvera à la fin de ce Catalogue.

MOUTARDE , Senevé , *Sinapis nigra* : gr. pl. annuelle.

Moutarde blanche , Plante-beurre , *Sinapis alba* : plante vantée par l'excellente huile qu'on dit en extraire.

Semences claires en mars en terrain meuble & bien exposé , un peu frais.

NAVET , *Brassica Napus* : plante basse à racine , annuelle.

Navet de Vaugirard.

Navet de Meaux.

Navet de Freneuse.

Navet de Belleville.

Navet jaune.

Navet rouge , long , & rond.

Navet vert , rond , petit.

Gros Navet vert , long , de Berlin.

Navet noir.

Navet Turnep.

Semer depuis mars jusqu'à la mi-août ; les premiers Semis en terre bien douce , parce qu'ils sont sujets à monter & durcir ;

tous par un tems pluvieux ou couvert , à cause du puceron. Voyez *Nota 20. page 19.*
NIELLE aromatique , Toute-épice , *Nigella fativa* : pl. moy. ann. Semez depuis mars jusqu'en septembre.

AILLET à Ratafia , *Dianthus caryophyllus*.
 Semences au printems.

OIGNON , *Allium Ceba* : plante bulbeuse ann.

Oignon rouge.

Oignon blanc.

Oignon pâle.

Oignon d'Espagne.

Oignon d'Espagne doux , alongé.

Petit Oignon blanc de Florence.

Semences à la fin de février en terres légères , à la fin de mars en terre forte. L'Oignon de Florence depuis février jusqu'en juin tous les quinze jours. Bonne terre amendée , mais non récemment fumée. En août & septembre on peut semer de l'Oignon blanc ; le repiquer en octobre ; l'arroser au printems ; il sera bon en mai ou juin.

Oignon de Manacarongha en l'isle de Madagascar ; très-doux , bon en salade. Semer de bonne heure sur couche , ou en terre préparée en bonne exposition.

ORIGAN , *Origanum vulgare*.

ORVALLE , *Salvia sclarea*.

OSEILLE , *Rumex acetosa* : plante moy. vivace.

Semences ou pieds séparés.

Oseille vierge, *Rumex acetosa arifolia* : grande; pieds séparés; bonne terre engraisée.

PANAIS, *Pastinaca sativa*.

Panais rond; quelquefois s'allonge un peu dans les terres fort légères.

Grande plante ann. Se cultive comme la Carotte; ne craint point la gelée.

PASTISSON, Voyez GIRAUMON.

PERSIL, *Apium petroselinum*.

Persil frisé, gros Persil.

Se sement au printems; tout terrain.

Persil de Hambourg à grosse racine. Semer au printems, planter, biner, rechauffer comme le Céleri-Rave. Racine bonne au gras & au maigre.

PIMPRENELLE, *Poterium sanguisorba* : petite pl. viv. Semences, pieds éclatés; printems & automne.

POIREAU, *Allium Porrum* : pl. bulbeuse ann. Semences en mars, repiqués en juin ou juillet en bonne terre grasse, labourée profondément.

POIRÉE, Bette, *Beta Cicla* : grande pl. bisannuelle.

Poirée blonde pour Cardes. Semences depuis mars jusqu'en août. La blonde craint les fortes gélées.

POIS, *Pisum sativum* : plante annuelle. Semences tous les mois excepté depuis août jusqu'en novembre; terrain neuf, sans engrais.

Pois-Michaux

ois Michaux : tendre, sucré, précoce, difficile sur le terrain.

ois Michaux de Hollande : plus précoce, très-bon, moins grand.

ois Dominé : bon, moins précoce ; printems.

ois à longue cosse : très-grand produit ; depuis avril jusqu'en juillet.

ois carré blanc : fort haut, tendre, très-sucré ; de la fin de mars à la fin de mai.

ois carré vert ; pour les Purées ; mars & avril.

ois vert Normand : semblable au précédent ; meilleur pour la Purée.

ois à cul-noir : carré, vert ; bon ; depuis la mi-avril jusqu'en juin.

ois de Clamart : grand rapport, tendre, sucré ; depuis avril, jusqu'au 15 juillet pour manger en vert.

ois sans parchemin : cosses tendres & sucrées ; mars, avril, mai.

ois sans parchemin à tache noire, bon, tendre ; mars, avril.

ois Nain vert ; bon vert, & sec ; mars & avril.

ois Nain sans parchemin.

ois Turc.

ois Anglois.

ois de Marly.

ois Laurent.

ois du mont Salvé.

ois Sans-pareil.

Pois Nain de Hollande.

Pois Nain à bouquet.

Pois Chiche blanc , ou Garvanche , bon , trop peu connu ; mars & avril ; bonne exposition.

POIVRE-LONG , Piment , *Capficum groffum* : pl. moyenne annuelle. Semences en avril , ou mars fur couche ; repiqués en mai en bonne terre.

POMME DE TERRE , Morelle-Truffe , *Solanum tuberosum* : grande plante tuberculeufe ; ann. plusieurs variétés. Tubercules en mars , rechauffés plusieurs fois.

POURPIER , *Portulaca oleracea*.

Fourpier vert.

Pourpier doré. Petite plante baffe annuelle. Semences depuis la mi-mai jufqu'en automne : mouiller fouvent la graine & le plant.

RAIFORT Sauvage , *Cochlearia armoriana* : dragéons enracinés ; depuis l'automne jufqu'au printems.

RAIPONCE , *Campanula Rapunculus* : petite pl. annuelle. Semez en juin , juillet , août , à l'ombre , en terre douce & bien préparée , couvrez feulemēt d'un peu de mouffe nette , ou de paille brifée , pour empêcher la terre de fe deffécher , durcir , crouter. Mouillez fouvent & très-légèrement. On peut en fermer parmi des raves , radis , oignon après l'avoir farclé. Si cette graine manque , c'eft faute d'attentions , & non de qualité ; car

elle se conserve bonne jusqu'à six ans.

RAPONTIC, *Rheum Raponticum* : grande pl.
viv. Racines éclatées; automne & printems.

RAVE, RADIS, *Raphanus sativus* : pl. basse
annuelle.

Radis blanc rond.

Radis faumonné rond.

Radis rouge ou violet rond.

Hâtifs. Semez tous les quinze jours, sur
couche, en terre douce, suivant la saison.

Mouillez tous les jours dans les tems secs.

Gros Radis blanc. Semez depuis mars jus-
qu'en septembre; mouillez souvent.

Gros Radis gris, & noirs. Semez clair depuis
mai jusqu'en septembre.

Petite Rave hâtive. Semez toute l'année.

Rave faumonnée : moins hâtive. Semez de
même, mais surtout l'été & l'automne.

Rave rouge longue.

Rave blanche longue.

Semez depuis mars jusqu'en septembre;
couvrez de litière dans les gelées.

Rave tortillée du Mans.

Grosse Rave blanche d'Ausbourg : fine, ex-
cellente. Semez très-clair en mai, juin &
juillet; mouillez souvent.

RHUBARBE de la Chine, *Rheum palmatum*.

Rhubarbe de Moscovie, *Rheum undulatum*.

Dragons enracinés.

ROMARIN, *Rosmarinus officinalis* : arbrisseau

toujours vert. Semences , marcottes , dragons enracinés ; exposition au nord.

ROQUETTE , *Brassica Eruca* : pl. moy. ann. Semez souvent comme le Cresson ; à l'ombre pendant les chaleurs : mouillez fréquemment.

RUE , *Ruta graveolens* : grande plante vivace. Semences ; pieds éclatés en mars ; soleil.

SALSIFIX blanc , *Tragopogon porrifolium* : petite pl. à racines , annuelle.

Salsifix Scorfonaire , *Scorzonera Hispanica* : petite pl. à racines , bisannuelle.

Semences depuis avril jusqu'en août ; terre meuble , non récemment fumée.

SANTOLINE blanche , *Santolina canescens*. J.

Santoline verte , *Santolina chamaecyparissus*.

SARIETTE , *Satureia hortensis* : petite pl. ann. Semences au printems.

Sariette vivace : semences & pieds éclatés.

SAUGE , *Salvia officinalis* : pl. moy. vivace.

Sauge panachée d'Angleterre , *Salvia officinalis tricolor*. J.

Sauge omelette , *Salvia officinalis variegata*. J.

Sauge à large feuille , *Salvia officinalis latifolia*. J.

Sauge de Catalogne , *Salvia officinalis tenuior*. J.

Pieds éclatés au printems.

TABAC , *Nicotiana Tabacum* : gr. plante ann.

Semez au printems sur couches ou en bonne terre & bonne exposition.

TAUPINAMBOUR, Tarratouffe de Virginie ;
Helianthus tuberosus : très-grande pl. viv.
 Tubercules au printems ; se mange au gras
 & au maigre ; moins farineux que la Pomme
 de terre.

THIM, *Thymus vulgaris*.

Thim à large feuille.

Thim citronné.

Petite plante vivace. Touffes éclatées, &
 semences au printems.

TOMATE, *Solanum lycopersicum* : grande pl.
 sarmenteuse annuelle.

Petite Tomate.

Semences sur couche au printems ; plan-
 tés en bonne terre, & bonne exposition.



II.

Fleurs & Plantes de Parterre.

ACONIT NAPEL, *Aconitum Napellus* : fleurs
 bleues, été.

ACONIT TUE-LOUP, *Aconitum Lycoctonum*.

Grandes plantes vivaces, qui marquent
 très-bien dans les Jardins Anglois. Semen-
 ces, mieux pieds éclatés depuis septembre
 jusqu'en mars ; tout terrain.

AMARANTHE TRICOLOR, *Amaranthus trico-
 lor*.

Amaranthe à queue de Renard , *Amaranthus caudatus*.

Amaranthe Passe-velours , *Celosia cristata*.

Amaranthe Amaranthoïde , *Gomphrena globosa*.

Plantes moyennes ann. fleurs , queues , panaches de diverses couleurs ; été , automne. Semez sur couches en février ou mars ; repiquez sur couche , ou en bon terrain bien exposé ; mettez en pleine terre à la fin de mai. Semez en pleine terre en avril & mai ; arrosez ; soleil médiocre. La Queue de Renard moins délicate pourroit se semer avant l'hiver.

AMBRETTE blanche & violette , *Centaurea moschata*.

Ambrette jaune , *Centaurea moschata lutea*.

Plante moyenne annuelle. Semez sur couche au commencement du printems ; repiquez en bonne terre bien exposée ; levez en motte ; arrosez.

ANCHOLIE , Gans - Notre - Dame , *Aquilegia vulgaris* : à fleur simple bleue , blanche , panachée & couleur de rose.

Ancholie à fleur double , des mêmes couleurs , *Aquilegia vulgaris multiplex*.

Grande plante ; été. Pieds éclatés depuis septembre jusqu'en mars.

ANEMONE , *Anemone Coronaria* : petite plante ; à fleur simple ; à fleur semidouble ; diverses variétés.

Anemone à fleur double à peluche ; grand nombre de belles variétés.

Printems. Pattes éclatées ; semences des Simples & des Semidoubles depuis juillet jusqu'en septembre , frottés dans les mains avec du sable pour rompre leur duvet qui les empêcheroit de s'attacher à la terre. Les Simples exigent peu de culture ; les Doubles , la même culture que la Renoncule. Craignent le grand froid & le grand soleil. Couvrir les planches defleuries , & les préserver du soleil après une pluie d'orage.

APIOS , *Glicine Apios* : grande plante grim-pante peu commune ; fleur purpurine odorante , agréable. Racines éclatées en octobre ou avril ; pied d'un mur au midi.

ASPHODELLE blanche , *Asphodelus ramosus*.

Asphodelle jaune , ou Verge-de-Jacob , *Asphodelus luteus*.

Grande plante viv. fleurs le long de la tige. Semences , septembre ou mars ; mieux pieds séparés en septembre ou mars ; tout terrain un peu frais.

ASTER , Œil de Christ , *Aster amellus* : pl. moyenne vivace ; fleur bleue , été , automne. Semences ; mieux traces éclatées au printemps & en automne ; tout terrain.

Aster de Syberie , *Aster Sybircus* : gr. plante.

Aster de la Nouvelle Angleterre , *Aster novæ Angliæ*.

Aster tardif, *Aster tardiflorus*.

Aster à grande fleur, *Aster grandiflorus*.

Aster misère, *Aster miser* : le plus tardif de tous.

ASTRAGAL des Alpes, *Astragallus Alopæcuroides*.

Astragal d'Orient, *Astragallus galegiformis*.

Grande pl. viv. fleur blanche en épi, été.

Semences au printems pour fleurir la seconde année ; pieds séparés, automne & printems.

AUBERGINE Violette, Melongene, *Solanum Melongena*.

Aubergine Ovifere, ou Plante qui pond, *Solanum oviferum*. J.

Plante moy. ann. fruit beau & singulier.

Semences sur les premières couches ; planter & élever en pot sur couche, ou platte-bandes d'Espalier au midi ; arrosements fréquents.

BALSAMINE double, *Impatiens Balsamina* : plusieurs variétés ; automne ; plante moy. ann. Semences au printems, mieux sur couches ; tout terrein ; mouiller.

BASSIN, BASSINET, jaune double, *Ranunculus bulbosus multiplex*.

Bouton d'or double, *Ranunculus acris multiplex*.

Plante moyenne viv. printems. Pieds séparés depuis septembre jusqu'en mars.

BAZILIC (petit), *Ocimum minimum* : petite

plante ann. été jusqu'aux gelées. Semences au printems, mieux sur couches; terre légère & bonne; mouiller.

BELLADONE d'été, Lys Belladone, *Amaryllis æstivalis* : fleurs en juin ou juillet.

Belladone commune d'automne, *Amaryllis Regina* : fleurs en août & septembre.

Cayeux en automne & au printems; terre grasse sablonneuse; exposition chaude; couvrir dans les fortes gelées.

BELLE-DE-NUIT, JALAP, *Mirabilis Jalapa* : fleurs pourpres, rouges, panachées, &c. automne.

Jalap du Mexique, *Mirabilis longiflora* : fleur blanche d'une odeur très-agréable.

Grande plante, qu'il est plus sûr & plus commode de semer au printems, que de multiplier de plant; tout terrain; mouiller.

BELLEVEDER, *Chenopodium Scoparia* : plante ann. pyramidale cultivée à cause de son port.

Semences au printems; tout terrain.

BERMUDIANE, *Syfyrrinchium Bermudiana* : petite plante vivace propre pour bordures; fleur bleue; été. Semences aussi-tôt que la graine est recoltée; pieds séparés, automne ou printems; tout terrain.

BLUET, Barbeau, *Centaurea Cyanus* : pl. moy. annuelle; fleur rose, blanche, puce, jaune, panachée, &c. Semences, fin d'été & printems; tout terrain.

BOURBONNOISE double, *Lychnis dioïca purpurea*. J. Plante moy. viv. fleur rouge, printems. Pieds séparés en automne, février & mars; bon terrain.

BOUTON d'argent d'Angleterre, *Ranunculus Aconitifolius*; plante moyenne viv. belle fleur blanche, printems. Pattes imitant celles d'Asperges, depuis août jusqu'en mars; mouiller.

BUGLOSE vivace, *Anchusa semper vivens*; pl. moy. viv. fleur bleu-céleste, printems. Semences au printems pour fleurir la deuxième année; œillets, octobre ou mars.

CAMPANULE à feuille de Pêcher, *Campanula Persicifolia multiplex*; plante moy. vivace: fleur double blanche & bleue.

Campanule à feuille d'ortie, *Campanula Trachelium multiplex*; même fl. plus grande.

Campanule Pyramidale, *Campanula pyramidalis*; grande pl. viv. fleur bleue en pyramide.

Semence très-fine en août ou septembre mieux qu'au printems, en terre douce & légère, très-peu couverte; vieux pieds, toute l'année.

Campanule des jardins, ou Viola Marina, *Campanula medium*: pet. pl. annuelle; fleur bleue & blanche. Semences au printems; tout terrain.

CARDINALE bleue, *Lobelia siphilitica*.

Cardinale rouge , *Lobelia Cardinalis*.

Pieds éclatés ; semences au printems en terrain léger , frais , ombragé , peu enter-rées : plantes délicates , difficiles à multi-plier ; mieux en pots , ferrées en hiver.

CHOU panaché , Chou à aigrettes , *Brassica oleracea Sabellica* : pl. bisannuelle. Semen-ces en mars ou juin ; panache mieux en ter-rein maigre , ou en pot.

COLCHIQUE simple , *Colchicum autumnale*.

Colchique double , *Colchicum autumnale mul-tiplex*.

Plante basse viv. tubercules au printems à trois pouces de profondeur ; déplanter tous les deux ans en août ou en mars ; terrain frais ; craint les grands froids.

COLOQUINTE-CITRON , *Cucurbita Citriformis*.

Coloquinte - Citron Poire , *Cucurbita Pyriformis*.

Coloquinte-Citron , Orange , *Cucurbita Auran-tiiformis*.

Plante ann. grimpante. Semences en avril & mai , mieux sur couches ; repiquer au pied des murs ou des tonnelles ; bonne terre ; mouiller.

COQUELOURDE , *Agrostema coronaria* ; pl. moy. viv. fleur rouge. Semences , printems & été pour fleurir l'année suivante.

Coquelourde double , *Agrostema coronaria multiplex* ; pieds séparés de septembre en

avril ; sujette à fondre , si elle n'est souvent replantée ; terrain élevé.

Coquelourde à fleur rose , *Agrostema cæli rosa* :
pet. pl. ann. été. Semences sur couches
au printems ; mouiller.

CORAIL des jardins , Poivre de Guinée , *Capfi-
cum annuum* : semences au printems , mieux
sur couches en pot , pour placer sur platte-
bandes ou gradins , lorsque le fruit marque.

CORBEILLE d'or , *Alissum saxatile* : pl. basse
vivace ; fleurs jaunes , printems. Semences
au printems , fleurs la deuxième année , éclats
& boutures de septembre en mars.

COREOPSIS à oreilles , *Coreopsis auriculata*.

Coréopsis de Virginie , *Coreopsis tripteris*.

Plante moy. viv. fleur jauné. Semences ,
printems : éclats de septembre en avril ; tout
terrain.

COURONNE Impériale , Fritillaire , *Fritillaria
Imperialis* : pl. moy. vivace ; à fleur simple ,
à fleur double ; rouge à double couronne ;
rouge à feuille panachée ; fl. jaunes , rouges ,
printems. Cayeux de juillet en mars ; tout
terrain.

Couronne Royale , *Fritillaria Regia*.

CROIX de Jérusalem , *Lychnis Chalcedonica* :
gr. pl. vivace ; bouquet de fleurs en parassol
blanches , pourpres.

Croix doubles pourpre.

Semences en mars & septembre ; racines

éclatées , sur-tout de la double , au printemps & en automne ; bon terrain frais ; mouiller ; peu de soleil.

CUPIDONNE , *Catananche Cærulea* : pl. moy. ann. ou bisannuelle ; fleur bleue. Semences au printemps sur couche , ou en terre préparée.

CYCLAMEN , Pain-de-pourceau , *Cyclamen Europeum* : pl. basse ; printannier à fleur blanches, blanches bordées de rouge , &c. soleil.

Cyclamen Automnal blanc , incarnat.

Cyclamen de Constantinople, *Cyclamen Orientale* : plusieurs variétés ; peu de soleil.

Oignons coupés verticalement par morceaux qui aient un œil , plantés en terre sèche & légère ; semences aussi-tôt la récolte , moyen très-long.

DIGITALE , *Digitalis purpurea* : fleur rouge-pourpre.

Digitale Ferrugineuse , *Digitalis ferruginea*.

Grande pl. bisannuelle. Plant , automne & printemps ; semences , septembre & mars ; terre légère , ombre.

DODECATHEON , *Meadia Dodecatheon* : pet. pl. viv. très-jolie ; fl. purpurine. Gilletons , automne & printemps , lents à se multiplier ; en pleine terre , ou en pot & ferrer en hiver.

EPHEMERE de Virginie bleue , & blanche , *Tradescantia Virginiana* : pl. moy. viv. touff.

fue ; fleurs en été. Pieds séparés en automne jusqu'au printems.

EPINARD-FRAISE , *Blitum capitatum* : pet. pl. ann. singulière par son fruit. Semences au printems ; tout terrain.

EUPATOIRE de Mesue , *Achillea ageratum* : pl. moy. viv. fl. jaunes , été. Semences au printems , pour fleurir la deuxième année ; mieux plant depuis l'automne jusqu'au printems ; tout terrain.

FILIPENDULE double , *Spiraa Filipendula multiplex* : pet. pl. vivace ; fl. blanche , été. Pieds séparés en sept. oct. fév. mars ; tout terrain.

FRAXINELLE , *Dicłamnus albus* : pl. moyenne viv. ; fleur violette , blanche , odorante. Racines éclatées ; semences , moyen trop-long , étant 18 mois à lever , si elles ne sont semées aussi tôt la récolte , & ne donnant de fl. que la cinquième ou sixième année ; tout terrain.

FRITILLAIRE ou Damier , *Fritillaria Meleagris* : petite pl. vivace ; beaucoup de variétés , printems. Cayeux , fin d'été & automne.

GALEGA , Rue de Chevre , *Galega officinalis* : gr. pl. vivace ; fl. bleue , blanche : semences au printems pour l'année suivante ; pieds séparés , printems & automne.

GENTIANE (petite) , *Gentiana acaulis* : pet. pl. viv. propre pour bordures ; fleur bleue. Dragons de septembre en avril ; semences recen-tes en terrain à l'ombre , mouillées souvent.

Gentiane (grande) *Gentiana lutea* : pl. viv.
racines en mars , à l'ombre.

GERANIUM à feuilles d'Aconit , *Geranium Batrachoides*. J. pl. moy. vivace ; fl. bleue. Pieds éclatés en automne & printems.

GESSE vivace , ou Pois vivace à bouquet , *Lathyrus latifolius* ; plante sarmenteuse de 4 ou 5 pieds ; beau bouquet rose , été. Semences , printems & été pour l'année suivante ; pieds transplantés , automne & printems ; tout terrain.

GEUM , *Saxifraga umbrosa* : pet. pl. viv. propre aux bordures ; pet. fleur singulière. Œillets de septembre en mars ; tout terrain.

GLAYEUL , *Gladiolus communis* : pl. moy. viv. plusieurs variétés. Cayeux séparés depuis août jusqu'en mars ; tout terrain.

GIROFLÉE , *Cheiranthus ineanus* : plante moy. bisann. ou trifannuelle ; fleurs simples , fl. doubles ; blanches , rouges , violettes , panachées.

Giroflée Royale , fleur blanche , rose ; printems , été , automne.

Semez en mars ; repiquez en planches ; mouillez au besoin ; vers la fin de septembre ouvrez les boutons de fleurs qui paroissent ; marquez les doubles ; levez-les en motte ; placez dans des pots , & garnissez de bonne terre ; mouillez largement , & mettez à l'ombre jusqu'à ce qu'elles soient bien re-

prises; en novembre portez dans l'Orangerie; n'arrosez que dans le besoin, & sans mouiller les feuilles; mettez à l'air quand il est doux; en mars tirez de l'Orangerie; en avril plantez en pleine terre: mouillez dans les sécheresses; retranchez les branches déflouries. Au lieu de mettre dans l'Orangerie, on peut enterrer les pots, ou même planter les pieds dans une plattebande d'espalier au Midi ou au Levant; avec des paillassons ou un auvent les préserver des pluies & de l'humidité qu'elles craignent plus que le froid.

GIROFLÉE QUARANTAINE, *Cheiranthus annuus*: pl. ann. moindre que la précédente; fl. simples, doubles blanches, rouges, violettes, panachées, &c. été, automne.

Giroflée Grecque, *Cheiranthus Græcus*. J. simple, double, violette, rouge, blanche.

Giroflée à feuille de bluet, *Cheiranthus annuus angustifolius*. J. toutes les variétés.

Giroflée Royale.

Semences au printems sur couches, ou en pleine terre; mettre en place, ou en planches jusqu'à ce que le plant marque les doubles; mouiller. Semer la Royale dès août ou septembre, & tâcher de la conserver pendant l'hiver.

GIROFLÉE Quarantaine de Mahon, Gazon de Mahon, *Cheiranthus maritimus*: pet. pl. ann. pour bordures & massifs bas; fl. simple d'un violet

violet rougeâtre , dure long-tems ; quelques fleurs doubles. Plant , ou semences presque toute l'année.

Giroflée jaune , *Cheiranthus cheiri* : pl. moy. fl. odorantes , printems , simples , doubles. Semences en mars & septembre ; marcottes en mai & juin , sévrées à deux mois ; boutures en mai , à l'ombre , mouiller ; tout terrain.

GRENESIENNE , *Amarillys Sarniensis* : plante moyenne ; fleur rouge , brillante , admirable , mais rare dans notre climat. Cayeux plantés au printems & en automne.

HELLEBORE noir , Rose de Noël , *Helleborus niger* : fl. rose pâle , hiver. Œilletons en toutes saisons.

Hellebore Printanier , *Helleborus hyemalis* ; fleur jaune , premier printems : Racines , été & automne.

Petites plantes vivaces ; tout terrain.

HEPATIQUE , *Anemone Hepatica* : pet. pl. basse viv. fleur simple blanche ; double bleue , rouge ; printems. Touffes séparées avec racines ; ombre ; terrain léger.

HERBE aux trachées , *Trachelium cœruleum* : pl. moy. bisann. fleur bleue. Semences très-fines , août ou septembre.

HYERACIUM d'Hongrie , *Hyeracium Aurantiacum* : pet. pl. viv. fl. jaune-aurore. Œilletons , automne & printems : semences au printems.

JACÉE des jardins , *Lychnis viscosa* : pl. moy.

viv. fl. rouge éclatant. Pieds éclatés en sept. oct. févr. bon terrain de potager.

JACYNTHÉ, *Hyacinthus Orientalis* : petite pl. vivace.

Jacynthe commune , à fleurs simples blanches , bleues , &c.

Jacynthe Passe-tout , fl. simples de toutes couleurs.

Jacynthe Civilis Lyonnaises & de Hollande , fl. doubles de toutes couleurs.

Jacynthes doubles de Hollande distinguées par nom , de différentes nuances , bleues , blanches , rouges , violettes , pourprées , jaunes , couleur de chair , &c.

Cayeux qui quelquefois dégèrent ; semences. En août, septembre ou mars labourer de bonne terre légère , sablonneuse , qui convient mieux à la Jacynthe que les terres composées ; y semer la graine en rayons , ou à la volée assez clair , & la bien recouvrir au râteau ; avant l'hiver suivant jeter sur le jeune Semis deux pouces de bonne terre meuble ; l'année suivante avant l'hyver , jeter encore autant de pareille terre ; la 3^e année les oignons marquent & sont formés. Les oignons de Jacynthe, tant jeunes que vieux, se déplacent en juillet. Ceux des simples se remettent en terre dès août & septembre : ceux des doubles en octobre & novembre , à six ou sept pouces de profondeur, & à cinq ou six de dis-

tance : si le printems est sec, donner quelques mouillures ; ne point couper les fannes après la fleur passée ; garder les oignons en lieu sec & à l'ombre. La Jacynthe craint la grande chaleur, le grand froid, l'humidité pourrissante, les terres glaiseuses & compactes, les fumiers & les engrais chauds. On peut corriger les terrains, ou en composer un avec du tan & du terreau gras, éteints, consommés pendant deux ou trois ans, avec du sable doux ; on peut en trouver de fort bon dans les bois, & sous les bruyeres.

JACYNTHÉ du Pérou, à fleur bleue, à fleur blanche, *Scilla Peruviana* : plante presque moyenne, vivace ; fleurs au printems bleues, blanches, en pyramide. Semences au printems, en août ou septembre en terrines qu'on met en serre l'hiver. Oignons enterrés assez profondément ; couvrir de litiere dans les neiges & fortes gélées ; les relever la troisième année à la fin de l'été, en automne & une partie de l'hiver.

JACYNTHÉ de mai, *Scilla amœna* : pet. pl. viv. fleur blanche très-odorante. Oignons, fin d'été & automne.

JASMIN d'Amérique, *Ipomœa coccinea* : plante grimpante annuelle ; fleurs ponceau en entonnoir, été, automne. Semences au printems ; soleil.

IMMORTELLE, *Xeranthemum annuum* : pl. moy.

ann. fl. blanche, violette, gris-de-lin, été, automne. Semences au printems, mieux sur couches.

Immortelle d'Amérique, *Gnaphalium Margaritaceum* : pl. moy. viv. fl. blanche. Drageons, printems & automne ; tout terrain.

JONQUILLE, *Narcissus Jonquilla* : pet. pl. viv. fleur jaune double grosse, petite, simple, odorante : printems. Cayeux, rarement semences ; s'élève & se cultive comme la Jacynthe ; demande moins de soins ; se plante mieux sur le côté, à quatre ou cinq pouces de profondeur, en bonne terre franche sans fumier ni terreau ; se leve tous les deux ou trois ans.

IRIS bulbeux, *Iris Xiphium* : plus de 50 variétés, tant de France que d'Angleterre, dont on peut fournir la collection depuis juillet jusqu'en octobre. Semences, fin d'été, automne ou printems ; mieux de Cayeux en août & automne.

IRIS bulbeux, fleur tigrée, *Iris Xiphium variegatum*. J.

IRIS de Perse, *Iris Persica* ; fleurit de bonne heure ; se rechauffe & réussit très-bien dans les terres chaudes.

IRIS de Suze, ou la Cordellière, *Iris Susiana* : moy. plante ; couvrir l'hiver, ou planter en grand pot, & placer dans l'orangerie en hiver.

IRIS de Florence, *Iris Florentina*.

Iris ordinaire, *Iris Germanica*; plusieurs variétés;

Iris à odeur de Sureau, *Iris sambucina*.

Iris (petit) *Iris pumila*, trace beaucoup.

Iris Gigot, *Iris fœtidissima*.

Iris Gigot à feuilles panachées, *Iris fœtidissima variegata*.

La plupart ont des variétés distinguées par les formes, grandeurs, couleurs, odeur, saison des fl. Ceux à racines se multiplient d'éclats au printems ou en automne; toute terre, mieux légère & fraîche.

JULIENNE, *Hesperis matronalis*: pl. moy. viv. fl. simples odorantes blanches, rouges, violettes: mai & juin. Pieds éclatés avec racines, mars ou automne; Boutures faites des tiges defleuries, à l'ombre, arrosées; bonne terre substantieuse.

Julienne jaune, Herbe de sainte Barbe à fleur double, *Sisymbrium*, *Erysimum Barbarea multiplex*: pl. moy. fleur de printems. Boutures & éclats, automne & mars, terrein de parterre; mouiller.

LARME de Job, *Coix Lachryma Jobi*; per. pl. ann. dans notre climat. Semences de bonne heure au printems, afin que les grains puissent mûrir avant les gelées.

LAVATERE trimestre, *Lavatera trimestris*: pl. moy. ann. fleur blanche, rose. Semences au printems sur couches, & en place; bon terrein; mouiller.

LILAS de terre , *Hyacinthus monstrosus* : pet. pl. vivace ; fleur bleue singulière , printems. Cayeux , août & automne ; terrain élevé.

LISERON (grand) *Convolvulus purpureus* : pl. grimp. ann. fleurs en entonnoir blanches , rouges , violettes ; été , automne. Semences en mars ou avril.

Liseron de Portugal , Belle-de-jour , *Convolvulus tricolor*. Semences en place.

LOTIER cultivé , *Lotus tetragonolobus* : pet. pl. ann. fleur purpurine , été. Semences au printemps , mieux sur couche.

LUNAIRE (grande) ou Bulbonac , *Lunaria annua* ; pl. moy. ann. fl. violet-clair , graines singulières. Semences au printemps.

LUPIN blanc , *Lupinus albus*.

Lupin bleu , *Lupinus hirsutus*.

Lupin jaune odorant , *Lupinus luteus*.

Lupin rose , *Lupinus varius* ; pl. moy. ann. Semences en mai.

LYS blanc , *Lilium candidum* : gr. plante viv. fleur simple.

Lys blanc à feuilles panachées , *Lilium candidum folio variegato*.

Lys blanc à fleur double , *Lilium candidum multiplex*.

Lys flagellé.

Cayeux ou oignons bulbeux depuis juillet jusqu'en mars ; bon terrain.

Lys-Asphodèle jaune , *Hemerocallis flava*.

Lys-Asphodèle rouge, *Hemerocallis fulva*.

Plante moyenne viv. fleur odorante, été.

Pieds éclatés, automne & hiver.

Lys Bulbifere, *Lilium bulbiferum* : plus coloré de rouge que le Lys-orangé. Cayeux depuis juillet ou mars, mieux que bulbes ou graines qui sont très long-tems à se former.

Lys-Orangé, *Lilium croceum* : il porte graine.

Lys-Orangé à feuilles panachées, très-rare.

Lys Hemerocale, *Lilium Calcedonicum*.

Lys Martagon, *Lilium Martagon* : plusieurs variétés.

Lys de Canada, *Lilium superbum*.

Lys de Pomponne, *Lilium Pomponium*.

Toutes ces especes se multiplient d'écaillés ou cayeux l'automne & l'hiver, lorsque le tems le permet; craignent les fortes gelées.

Lys des Incas, *Alstroæmeria Pelegrina* : petite pl. vivace; fleur blanche tigrée. Semences au printems; pattes, fin d'été & d'automne, mieux en pot; bien exposée, & abritée l'hiver; craint beaucoup l'humidité.

Lys de Saint-Bruno, *Anthericum Liliastrum* : pl. moy. viv. fleur blanche odorante le long de la tige, printems. Racines séparées, été, automne, hiver; craint les grands froids.

Lys de Saint-Jacques, Croix de Calatrava, *Amaryllis formosissima* : pet. pl. viv. fl. d'un beau cramoisi vif, printems. Cayeux; en pot pour

le ferrer pendant l'hiver, ou le mettre à l'abri de la gelée & de l'humidité qu'il craint plus que le froid. Cet oignon peut passer l'hiver hors de terre sur une planche en lieu sec. Si après la fleur on le prive d'eau jusqu'à ce qu'il soit sec, & qu'ensuite on le ranime dans une couche par des arrosemens modérés, il pourra fleurir une seconde fois.

LYS-NARCISSE, *Lys de Mathiole*, *Pancratium maritimum* : pl. moy. viv. fleur blanche en bouquet, été. Semences dès-qu'elles sont mûres, cayeux en automne ; très-long à élever ; couvrir en hiver.

MARGUERITE, *Bellis perennis hortensis* : petite pl. basse viv. fl. blanches, rouge-pâle, rouge-foncé, panachées. Pieds séparés le printemps ou l'automne ; terrain un peu frais.

MATRICAIRE double, *Matricaria parthenium multiplex* ; pl. moy. vivace fort touffue ; fleurs blanches odorantes. Semences en mars ou après récolte ; pieds séparés. Après les premières fleurs couper toutes les tiges, arroser, elle fleurit une seconde fois.

MAUVE des jardins, *Malva orientalis* ; gr. pl. ann. grandes fleurs purpurines nombreuses. Semences en mars & avril.

Mauve frisée, *Malva crispa* ; gr. pl. annuelle, singulière par son feuillage. Semences au printemps sur couche ; bon terrain ; mouiller ; propre pour jardins Anglois.

MILLE-FEUILLE à fleur rouge, *Achillea Millefolium* ; pl. moy. viv. Pieds séparés , printems & automne.

MIOSOTIS , *Cerastium incanum* ; pet. pl. vivace nouvelle dans les jardins sous le nom d'Argentine , parce qu'elle est toute blanchâtre ; fl. nombreuses d'un beau blanc , durent longtemps, printems. Plant, de sept. en mars, espacé, en bordures, tapis, corbeilles ; terrain sec.

MONARDA beau rouge , *Monarda didyma*.

MONARDA gris-de-lin , *Monarda fistulosa* ; plante moy. viv. fleurs en été. Traces , automne & printems ; en pot , ou en pleine terre douce , grasse , à l'ombre ; transplanter de tems en tems.

MUFLE de Veau ou de Lion , *Antirrhinum majus* ; pl. moy. bisann. Semences , automne ou printems ; planter en avril ; bon terrain.

MUGUET , Lys des vallées , *Lilium convallium*.

MUGUET à fleur double , *Lilium convallium multiplex* ; pet. pl. vivace , fleurs très-odorantes en mars. Pieds séparés , automne & hiver ; ombre.

MUSCARI odorant , *Hyacinthus Muscari* ; très-pet. pl. viv. fleur sans éclat , mais très-odorante , printems. Oignon ou cayeux en automne ; bosquets.

MUSCIPULA , Atrape-mouche , *Silene Armeria* ; pl. ann. petits bouquets de fleurs rouges , blanches , odorantes. Semences en mars ou septembre ; bon terrain.

NARCISSE à bouquet, *Narcissus poeticus* ; pet. pl. viv. à fl. simple, à fl. double.

Narcisse de Constantinople, *Narcissus tazetta* ; fleur blanche mêlée de jaune odorante. Ceux-ci & plusieurs autres à fleur simple ; fleur de printems. Cayeux en octobre à 3 ou 4 pouces de profondeur.

NIGELLE de Damas, Cheveux de Vénus, *Nigella Damascena* ; pl. moy. ann. fl. bleue de diverses nuances. Semences en place en août, septembre, mars, avril.

OBELISCAIRE (grande, petite) *Rudbeckia hirta* ; pl. moy. bisann. fl. fin d'été & automne ; difficile à élever ; semer aussi-tôt la maturité en terre légère, peu couvrir ; en pots, & ferrer l'hiver.

ŒILLET, *Dianthus Caryophyllus* ; à fl. simple, double ; blanche, rouge, violette, incarnate, rose, jaune, piquetée, tricolor, &c. nuances & mélanges sans nombre de toutes ces couleurs. En mars, avril, & mieux en mai semer en bonne terre meuble ; en juillet ou août, avant ou après une pluie repiquer le jeune plant ; pendant l'hiver le préserver des fortes gelées ; l'été suivant il marquera ; choisir les pieds qui méritent d'être conservés & multipliés par la marcotte. En juillet ou août marcotter les tiges fortes & bien formées (on peut faire des boutures des autres) ; en octobre sévrer les marcottes, & les mettre en

place ou en pépinière jusqu'en mars ; on peut différer de les sévrer jusqu'en mars ; en octobre mettre en pots les marcottes de variétés précieuses dans une terre convenable ; les laisser à l'ombre pendant une quinzaine sur des gradins élevés , & non sur terre ; les préserver des pluies de la fin d'octobre ; dans le commencement de décembre les placer dans la serre ; les y défendre de l'humidité , en les mettant à l'air & au soleil ; vers la fin de mars les tirer de la serre ; les ranger en lieu que le soleil ne frappe pas tout le jour ; les mouiller au besoin.

ÆILLET de la Chine , *Dianthus Sinensis* : pet. pl. trifann. fl. simples , semidoubles , doubles , très-grand nombre de variétés , été.

Æillet de la Chine à feuille d'Æillet de Poëte , nouv. variété. Sem. en mars ou avril , mieux sur couche ; bonne terre légère ; mouiller.

ÆILLET de Poëte , *Dianthus barbatus* : à fleur simple , double.

Æillet d'Espagne , *Dianthus Hispanicus multiplex* : fleur double , simple.

Æillet Mignardise ; *Dianthus versicolor* : fleurs simples , doubles , odorantes ; plusieurs variétés. L'Æillet d'Espagne ne se multiplie que de pieds éclatés , & de boutures comme la Julienne double ; les autres de pieds éclatés , & de semences en mars ; bon terrain.

Æillet d'Inde , *Tagetes patula* : pl. moy. ann.

fl. jaune veloutée , automne. Semences en mars ; transplantés à la fin d'avril.

OMPHALODÈS , *Cynoglossum Omphalodes* : pet. plante viv. petite fleur d'un bleu éclatant , printems. Drageons , fin d'automne & d'hiver ; un peu d'ombre.

Omphalodès , Nombril de Vénus de Portugal , *Cynoglossum linifolium*.

OREILLE d'Ours , Auricule , *Primula auricula* : petite plante viv. fleurs printems & automne , jaunes , cramoisies , panachées , lustrées , brillantes , satinées , veloutées , bizarres , &c. à simple , double , triple cloche , en bouquet , &c. très-grand nombre de variétés , nuances & mélanges de couleurs. Œilletons coupés ou éclatés avec racines au printems ou en automne. Labourer & dresser un terrain frais , léger , substantieux ; y semer la graine sans la couvrir , mais battre un peu la terre pour l'y attacher : jeter dessus de la mousse , de la paille ou un paillasson ; arroser au travers ; trois semaines après , retirer la paille ; si la graine ne commence pas à lever , elle se fera attendre long-tems. Le plant étant assez fort , le mettre en pots ou en pleine terre ; fraîcheur , peu de soleil.

ORNITHOGALON , Epi de la Vierge , Epi de lait , *Ornithogalon album*. J. Plante vivace , fleurs blanches en ombelle , bleues mêlées de blanc. Cayeux ; semences ; culture de la

Jacinthe : transplanter les oignons tous les trois ans à la fin de l'été, l'automne & l'hiver.

OSIER fleuri, Laurier de Saint-Antoine, *Epilobium Antonianum* : pl. viv. assez élevée ; fleur rose le long de la tige. Racines ; terrain léger, humide & ombragé.

Osier fleuri des Alpes, *Epilobium angustifolium*

PALME de Christ, Ricin, *Ricinus communis* : très-grande plante ann. fleurs & graines singulières. Semences sur couches ; planter à bonne exposition.

PANICOT Amétiste, *Eryngium Ametistinum* : plante moy. viv. rustique, toute d'un bleu d'Amétiste. Semences en automne pour fleurir la deuxième ou troisième année ; transplanter d'octobre en mars.

Panicot de mer, *Eryngium maritimum* : pl. viv. rustique.

PAQUERETTE (grande), *Chrysanthemum coronarium* : plante moy. bisann. fleurs blanches, jaune-doré ; automne. Semences au printems.

PASSE-ROSE, Rose-tremière, *Alcea rosea* : grande plante viv. fleurs de toutes couleurs, Semences au printems, fl. la second année.

Passe-Rose de la Chine, *Alcea Sinensis*. J. Plante viv. moindre dans toutes ses parties : jolies fleurs rose bordées de blanc. Semen-

ces au printems ; fleurit dès août ; mouiller.

PAVOT, *Papaver somniferum* : grande plante ann. fleurs de diverses couleurs, simples, doubles.

Pavot de Hollande, ou **Pavot Feu-foyer**, joli Pavot panaché.

Pavot Coquelicot : *Papaver rhæas* : pl. moy. ann. fleurs de diverses couleurs, simples, doubles. Semences en place au printems & à la fin de l'été.

Pavot de Tournefort, ou **Pavot du Levant**, *Papaver Orientale* : plante moy. viv. fleur rouge. Semer au printems & en été pour l'année suivante ; mieux séparer les pieds d'octobre en mars.

Pavot du Mexique, **Pavot épineux**, *Argemone Mexicana* : plante moy. ann. tige herbacée hérissée de petites épines ; fleur blanche, jaune ; été & automne. Semences au printems sur couches.

PÉONE, **Pivoine mâle**, *Pæonia officinalis mas.*

Péone femelle, *Pæonia fœmina.*

Pivoine de Portugal, *Pæonia Lusitanica.*

Pivoine velue, *Pæonia villosa.*

Pivoine à feuilles très-découpées, *Pæonia tenuifolia.*

Grande plante viv. fleurs blanches, rouges, doubles, simples ; fin du printems. Semences ; mieux racines éclatées en mars ou octobre.

PERCE-NEIGE, *Galanthus nivalis* : petite pl. basse viv. fleurs blanches, bordées de vert, simples, doubles, en février & mars.

Perce-Neige (grande) double & simple, *Leucoïum vernalis* : fleurs blanches au printems. Oignons en été & automne.

Perce-Neige d'été à bouquet de huit ou neuf fleurs blanches en avril, *Leucoïum æstivum*. Oignons, automne & printems. Terrain frais, ombre.

PERSICAIRE du Levant, *Polygonum Orientale* : très-grande pl. ann. fleur en épi blanche, rouge; été, automne. Semences sur couches de bonne heure au printems, moins bien en septembre & octobre; bon terrain; arroser.

PERVENCHE-ROSE, Pervenche de Madagascar, *Vinca Rosea* : petite plante de terre chaude qui peut se cultiver dans les jardins comme plante ann. la semer sous chassis sur les premières couches; l'y élever; arroser; fleurit à la fin de l'été.

Pervenche bleue, blanche, violette, simple & double; *Vinca minor*.

Pervenche panachée, *Vinca minor variegata*.

Pervenche (grande), *Vinca major*.

Pieds séparés, placer à l'ombre.

PHLOX printannier (petit) à fleur violette, *Phlox pilosa*.

Phlox (moyen) à feuille étroite : *Phlox glaberrima* : fleur fin du printems.

Phlox (grand) tige pointillée, *Phlox maculata*.

Phlox de la Caroline, encore plus grand, *Phlox Caroliniana* : grandes panicules de fleurs d'un beau rouge au haut de la tige ; ainsi que le précédent fleurit en été.

Phlox blanc, *Phlox alba*, rare ; fleurit commencement d'été.

Ces belles plantes vivaces se multiplient de boutures & de pieds séparés au printemps & en automne.

PIÉ-D'ALLOUETTE, Delphinette, *Delphinium Ajacis* : plante moy. ann. fleurs doubles, plusieurs variétés. Semences en place au printemps, ou à la fin de l'été.

Pié-d'allouette vivace, *Delphinium elatum* : gr. pl. viv. fl. d'un bleu azur, en été. Semences, printemps & automne pour fleurir la seconde année ; pieds éclatés en octobre, fév. mars.

Pié-d'allouette, *Delphinium azureum* : encore plus grand. Ces deux propres pour les grands parterres & les jardins Anglois.

Pois d'odeur, Gesse odorante, *Latyrus odoratus* : pl. moy. ann. grimpante ; fleurs de pois violettes, rose, odeur de fleur d'Orange. Semences au printemps.

PRIMEVERRE, *Primula veris* : plante basse viv. fleurs, printemps & automne, à simple, double, triple cloche ; grand nombre de variétés, nuances & mélanges de couleurs.

Primeverre

Primeverre à bouquet, *Primula veris elatior*.

Pieds séparés; semences en mars ou septembre; ombre; terrain frais.

Primeverre à fleur double, blanche, jaune, violette. Pieds éclatés.

PTARMICA, petit bouton d'argent; *Achillaea Ptarmica*; pet. pl. viv. jolies fleurs blanches, été, automne. Traces ou pieds séparés.

RAISIN d'Amérique, *Phytolacca decandra*; très-gr. pl. viv. tige très-forte; beau fruit en grappes rouges. Semences au printems: éclats de racines de l'automne jusqu'au printems; pour les grands parterres.

REINE Marguerite, *Aster Sinensis*: plante moy. ann. fleur en automne simples, doubles, blanches, violettes, gris-de-lin, rouges, couleur de chair, les mêmes panachées.

Reine Marguerite petite à pompoms.

Reine Marguerite à dentelle.

Reine Marguerite Anemone, &c.

Semez en mars & avril; plantez en juin & juillet; mouillez.

REINE des Prés à fleur double, *Spiraea ulmaria multiplex*; pl. moy. viv. fleur blanche, etc. pieds éclatés au printems & en automne; arroser.

RENONCULE, *Ranunculus Asiaticus*; pl. basse viv. fleurs simples (on en cultive peu); doubles, doubles franches, semidoubles porte-graines; très-grand nombre de va-

riétés de couleurs , de nuances , & de mélanges de couleurs. Cayeux , ou griffes séparées. Recueillir la graine des Semidoubles dont les pétales sont le plus nombreux , d'une forme régulière , d'une belle grandeur , de couleurs éclatantes , satinées , veloutées , ou bizarres ; la conserver enveloppée en lieu sec , sans l'égrainer ; depuis la mi-août jusqu'à la fin de septembre labourer & unir un bon terrain léger au levant ou au couchant ; y semer la graine à claire voie ; tamiser dessus de bonne terre , ou du terreau fin , seulement pour cacher la graine ; étendre des paillassons ou de la paille soutenue sur des gaulettes placées horizontalement à deux ou trois pouces de la superficie du terrain ; donner au travers un ample arrosage ; en donner souvent de petits pour entretenir l'humidité ; de trois à six semaines après la graine sera levée ; retirer les paillassons , & les placer (ou une toile) verticalement , pour défendre le jeune plant du soleil ; sarcler , arroser , préserver des grands froids. Après le printemps suivant déplanter les jeunes griffes , lorsque les feuilles commenceront à sécher ; les conserver en lieu sec.

Plantez les griffes formées , tant jeunes que vieilles , à quatre pouces de distance & à deux doigts de profondeur , en août celles

qu'on veut faire fleurir pendant l'hiver ; Pivoine , Chassî-coîfé , Aurore , Moscovite , &c. en octobre & novembre les autres ; abriter dans les grands froids ; mouiller modérément au printems ; couvrir les fleurs avec une toile pendant le grand soleil ; dès que la fleur est passée , couper les tiges , excepté celles qu'on réserve pour graines ; quand les feuilles se séchent , relever les griffes ; les bien nettoyer ; laisser sécher à l'air à l'ombre ; envelopper & ferrer en lieu sec. Il est bon de laisser réposer les griffes pendant un an ; & de ne planter les mêmes que de deux années l'une. Une terre compacte , humide , glaiseuse , trop grasse , le fumier neuf , contraires à la Renoncule.

Nota. Ne plantez point les griffes au plantoir ; mais faites des rayons de profondeur convenable ; saisissez la griffe & l'embrassez avec l'extrémité des cinq doigts ; placez-là en terre , en appuyant assez fortement pour que le dessous de la griffe soit bien rempli & garni de terre ; ensuite remplissez les rayons. Cette observation n'est pas moins importante pour les pattes , les oignons , les bulbes , les tubercules de toutes les fleurs & plantes.

RESEDA , *Reseda odorata* : pl. basse annuelle en pleine terre ; fleurs odorantes ; p. intems ,

- été, automne. Semences, printems & été.
- RUBAN (grand) Roseau panaché, *Arundo Donax variegata*. J. Gr. pl. rare ; beau feuillage satiné. Boutures, pieds séparés au printems.
- Ruban (petit) Gramen panaché, *Phalaris arundinacea picta* ; pl. moy. vivace ; jolie feuille rayée de vert & de blanc. Pieds séparés, automne & printems.
- SAFRAN printannier, *Crocus sativus vernus* ; pet. pl. vivace ; fleur blanche, jaune, bleue, mêlée, pourpre, &c. février & mars. Cayeux plantés à deux pouces de profondeur en automne & au printems ; bon terrain ; soleil ; déplanter tous les trois ans en mai.
- Safran vrai du Gatinois, *Crocus sativus autumnalis* ; fleurs violet-pâle odorantes ; se plante au commencement d'août à quatre pouces de profondeur.
- SAIN-FOIN d'Espagne, *Hedysarum coronarium* ; pl. moy. bisannuelle en ce pays, tiges nombreuses ; fleur d'un beau rouge. Semences au printems pour fleurir l'année suivante ; craint les grands froids ; terrain élevé.
- SAPONAIRE double, *Saponaria officinalis multiplex* ; pl. moy. traçante vivace, fleur couleur de chair. Pieds séparés, automne & printems.
- SAXIFRAGE blanche double, *Saxifraga granulata* ; pet. pl. vivace propre pour bordures & massifs ; fleur au printems. Bulbes, été & automne.

Saxifrage de la Chine, *Saxifraga stolonifera*.

J. per. pl. viv. rampante, singulière ; fleurs au printems. Traces, automne & printems.

Saxifrage de Sibérie, *Saxifraga crassifolia* ; belle pl. moy. viv. fleur rouge au commencement du printems. Œillets en automne.

SCABIEUSE des jardins, Fleur des Veuves, *Scabiosa atropurpurea* ; pl. moy. ann. fleurs violet-cramoisi, &c. été, automne. Semences en mars & avril ; soleil.

SCEAU de Salomon, *Convallaria polygonatum odorum*. J. pl. vivace traçante ; fleur double blanche odorante, au printems. Racines en automne ; ombre ; terrain léger, humide.

SEDUM pyramidal, *Saxifraga pyramidalis* ; pl. trifann. fleurs disposées en lustre. Œillets, fin d'été, printems, automne ; ne fleurit pas constamment par-tout.

SENEÇON rouge ou d'Afrique, *Senecio elegans* ; fleur moy. ann. fleurs simples, doubles, d'un beau rouge, été, automne. Semences au printems, mieux sur couches.

SOUCI double, *Calendula officinalis* ; pl. basse ann. fleurs jaunes doubles, été, automne. Semences au printems.

STATICÉ, *Statice armeria* ; ou Gazon d'Olympe : pet. pl. basse vivace ; fleurs de plusieurs nuances, printems, été. Touffes éclatées.

TARASPIE, *Iberis umbellata* ; pl. moy. ann. fleurs blanches, gris-de-lin, été, automne.

Taraspic petit , *Iberis amara* ; fleurs violettes ,
& blanches. Semences , août , septembre &
printems.

TOUTE-BONNE des Jardins , *Salvia Sclarea* ;
gr. pl. bisann. pour les grands parterres ;
fleur bleue , printems , été. Semences au
printems.

TREFLE rouge du Roussillon , *Trifolium incarnatum*. Plante ann. sa fleur en épi d'un très-beau rouge , peut lui faire trouver place dans les parterres , & mieux dans les Jardins Anglois. Il donne de très-bon foin , forme de beaux tapis ; aime les terrains élevés , bien préparés & ameublis.

TUBEREUSE , *Polyanthes Tuberosa* : plante viv. fleurs simples , doubles blanches , très-odorantes , été , automne. Oignons en pot ou en caisse dans une couche de chaleur tempérée ; fleurissent rarement deux fois dans ce climat.

TULIPE , *Tulipa Gesneriana* : plante moy. viv. fleurs simples , doubles , printems ; variétés très-nombreuses , tant des communes , que des belles dénommées. Semences , mieux cayeux ; même culture que la Jacinthe.

Tulipe odorante dite *Duc de Thol* ; plantée sur couches en automne , ou dans un appartement chaud ; fleurit en janvier , février , mars.

VALÉRIANÆ Grecque , *Polemonium œeruleum* :

plante moy. viv. fleurs bleu-clair , printems.
Semences en mars ; pieds éclatés , automne ,
hiver , printems.

VERGE D'OR toujours verte , *Solidago semper-virens*.

Verge d'or de Canada , *Solidago Canadensis*.

Verge d'or (grande) , *Solidago altissima*.

Verge d'or du Mexique , *Solidago Mexicana*.

Verge d'or de Mariland , *Solidago Marilandica*. J.

Grandes pl. viv. touffues pour les grands
parterres & jardins Anglois. Drageons ou
éclats , automne & printems.

VÉRONIQUE des Jardiniers , *Lychnis Flosculi* ; plante moy. viv. fleur d'un beau rouge
au printems. Boutures , pieds éclatés , au-
tomne & printems.

Véronique à fleur bleue en épi , plusieurs va-
riétés ; plante moy. viv. Semences & dra-
geons , automne & printems.

VERVEINE de Miclon , *Verbena longiflora*. J.

Plante moy. fleur rouge presque toute l'an-
née. Quoique d'Orangerie , elle peut se cul-
tiver dans les jardins ; élevée de graine ou
de boutures au printems. Elle fleurit la mê-
me année ; elle se transplante en automne
& au printems.

ZINNIA rouge , *Zinnia multiflora*.

Zinnia jaune , *Zinnia pauciflora*.

Zinnia Hybride , *Zinnia Hybrida*.

Plantes moy. ann. fleur fin d'été & automne. Semences au printems sur couches, ou en terre préparée.



III.

Arbres Fruitiers.

ABRICOTIER, *Prunus Armeniaca.*

Précoce ou hâtif musqué; petit, un peu coloré, abondant en eau un peu parfumée de musc; commencement de juillet.

Blanc ou Pêche; petit, très-peu coloré, fin, délicat, peu relevé; commencement de juillet.

Commun; gros, fort coloré, un peu pâteux, peu relevé; mi-juillet.

Angoumois; petit, alongé, rouge-foncé, vineux, relevé; amande douce, mi-juillet.

De Hollande, Amande-Aveline, moyen, très-coloré, fin, fondant, relevé, amande douce d'un goût d'amande & d'aveline; fin de juillet.

De Provence; fruits nombreux, petits, rouge-vif, vineux, fins; amande douce, fin de juillet.

De Portugal; fruit petit, de couleurs légères,

fin ; fondant , relevé , excellent ; amande amère ; mi-août ; très-fertile.

Alberge , *Prunus Armeniaca dulcis*. J. Petit , applati , peu coloré , vineux , très-relevé ; chair rouge ; amande amère ; abondant en plein vent.

De Nanci , Abricot-Pêche , très-gros , très-peu coloré , fondant , plein d'eau agréable ; chair rouge , mi-août.

Du Pape ; violet foncé ; de la forme d'une grosse Prune de Monsieur ; chair brune ; la feuille plus large que celle du Mirabolan , auquel cet Abricotier ressemble.




AMANDIER , *Amygdalus communis dulcis*. J. commun , petit fruit , amande douce , noyau dur.

Des Dames ; fruit plus gros , noyau fort tendre , amande douce.

A gros fruit ; gros noyau dur , amande ferme & très-bonne.

Leurs variétés à amandes amères.



AZEROLIER d'Italie , *Gratægus Azarolus* ; fruit de fantaisie estimé pour la confiture. Espalier.



CERISIER , *Cerasus fructu rotundo acido*.

Précoce nain , *Cerasus pumila*. J. fruit très-petit , rouge-léger , trop acide ; fin de mai.

Royale hâtive , May - Duke ; fruit moyen ;
beau rouge , très-bon ; fin de mai.

Hâtif ; fruit moyen , rouge-clair , aigre ; rouge-
foncé , moins acide , mais moins hâtif.

A bouquet ; plusieurs fruits à une seule queue ,
rouge-vif , trop acides ; fin de juin.

De la Toussaint ; fruits successifs jusqu'aux
gelées , petits , rouge vif , trop aigres.

Commun ; plusieurs variétés ; beaux fruits , un
peu aigres ; fin de juin.

De Montmorency ; belle variété du commun ;
gros fruit plein d'eau agréable ; commen-
cement de juillet.

De Montmorency , gros Gober à courte queue ;
gros fruit , rouge vif , excellent , peu abon-
dant , queue fort courte ; mi-juillet.

De Villennes rouge , gros fruit bien arrondi ,
rouge-clair ; eau abondante , relevée , ex-
cellente ; commencement de juillet.

De Villennes ambré ; gros fruit jaune d'ambre
lavé de rouge-clair , eau abondante , douce ,
mi-juillet.

Royale , Chery-Duke ; gros fruit très-abon-
dant , rouge très-foncé , eau très-douce ;
commencement de juillet.

Cerise-guigne ; gros fruit , forme de guigne ,
très-abondant , rouge brun , eau douce ;
fin de juin.

Royale nouvelle ; variété de la précédente ;
fruits semblables , mûrissent successivement
pendant un mois.

Griotte ; *Cerasus austera*. J. gros fruit très-arrondi , noir , plein d'eau douce très-agréable ; commencement de juillet.

Griotte de Portugal , plus gros fruit , un peu moins noir , chair plus ferme ; eau douce , relevée ; commencement de juillet.

Griotte d'Allemagne ; gros fruit un peu aplati , rouge très-brun , eau abondante un peu trop acide ; mi-juillet.

Cerise à ratafia , petite Griotte ; variété de la Griotte , un peu amère & âcre.

GUINDOUX , gros & excellent fruit noir ; mi-juillet.

BIGARREAU , *Cerasus Bigarella*.

A gros fruit rouge foncé , ferme , succulent ; relevé , excellent ; fin de juillet.

A gros fruit blanc ; variété , gros fruit blanc & rouge , tendre , moins relevé.

GUIGNE , *Cerasus Juliana*. J.

A gros fruit blanc lavé de rouge ; chair assez ferme & de bon goût ; mi-juin.

A gros fruit noir luisant ou Bigaudelle ; fruit presque comparable aux cerises ; fin de juin.

MERIZIER , *Cerasus sylvestris*. J. ne se cultive point dans les jardins ; celui à gros fruit noir est employé pour les liqueurs.



COIGNASSIER , *Pyrus Cydonia*.

Coignassier de Portugal , *Pyrus Cydonia Lusitana*. J. seul qui mérite d'être cultivé pour

son fruit très-gros, très-beau, bon en compotes & en confitures.



ÉPINEVINETTE, *Berberis vulgaris*.

Épinevinette sans pepin, *Berberis vulgaris abortiva*; peut se placer dans le coin le plus maigre du potager. Les autres variétés sont communes dans les haies.



FIGUIER, *Ficus carica*, à fruit blanc; plein de suc doux & agréable; le plus propre à notre climat.

Figue Angélique, fruit jaune, moins gros, fort bon; abondant en automne.

Figue Violette, *Ficus carica violacea*. J. fruit violet-foncé, chair rouge; bon dans les années chaudes.

Dans notre climat trop tempéré, les Figues qui ne naissent qu'après la Saint-Jean ne peuvent mûrir; & des yeux qui les ont produites il n'en sort point d'autres au printemps. Pour empêcher les Figuier de donner ces Figues tardives qui périssent pendant l'hiver, il faut, entre le premier & le dix juin, pincer les nouveaux bourgeons forts à quatre ou cinq yeux (ceux qui ne sont pas de force à donner du fruit n'ont pas besoin d'être pincés): aussi-tôt il sort des Figues qui, étant nées avant la Saint-Jean, peuvent mûrir en automne; il sort aussi de

nouveaux jets qui deviennent assez forts pour résister à l'hiver ; mais trop tardifs pour produire des Figes avant l'hiver.

Au printemps suivant , tailler à une longueur convenable ces bourgeons , dont tous les yeux donneront des Figes. Tailler à 3 ou 4 yeux les bourgeons moyens ; & les foibles à 1 ou 2 yeux.

FRAMBOISIER , *Rubus Idæus*.

Framboisier à fruit rouge.

Framboisier à fruit blanc.

Framboisier des Alpes , qui donne deux récoltes , en été , & en automne ; fruit rouge.



GROSEILLIER à grappes , *Ribes rubrum*.

Groseillier à fruit rouge.

Groseillier à fruit couleur de chair , moins acide.

Groseillier à fruit blanc , encore moins acide.

Groseillier à gros fruit blanc , Groseille perlée ; fruit un peu plus gros & plus doux.

Groseillier à fruit noir , Cassis ; gros fruit noir , âcre , inutile pour la table.

Groseillier épineux , *Ribes uva-crispa* ; fruit de fantaisie , de peu d'usage ; plusieurs variétés.



MURIER , *Morus nigra* ; à fruit noir.


Mûrier blanc , *Morus alba*.

Mûrier d'Italie , *Morus Italica*. J.



NEFFLIER, *Mespilus Germanica* ; à gros fruit ; peu délicat ; l'art est nécessaire pour le faire mollir.

Nefflier sans noyaux, *Mespilus Germanica abortiva* : petit fruit ; mollit bien.



PÊCHER, *Persica*.

Avant-Pêche blanche ; très-petit fruit blanc , peu succulent , sucré , musqué ; mi-juillet.

Avant-Pêche rouge ; fruit moins petit ; rouge-vif , sucré , musqué ; commencement d'août.

Pêche jaune ; fruit plus gros , sucré , vineux , plus tardif.

Double de Troies , petite Mignonne ; fruit plus gros que les précédents , blanc & rouge-foncé ; chair fine , blanche ; vineuse , agréable ; fin d'août.

Pêche-Cerise ; variété de la précédente , de même grosseur , blanche & rouge-cerise ; médiocre.

Madelaine blanche ; peau & chair blanches ; fine , délicate , sucrée , musquée ; grosseur médiocre ; mi-août.

Madelaine rouge , Madelaine de Courson ; fruit plus gros que le précédent , d'un beau rouge , sucré , relevé , très-bon ; mi-septem-

bre. Elle a une variété tardive qui mûrit à la fin d'octobre.

Pêche Malte ; variété de la Madelaine blanche, fine, musquée, excellente ; rouge & blanche ; mi-septembre.

Pourprée hâtive ; gros fruit, rouge-foncé, fin, fondant, très-bon ; commencement d'août.

Pourprée tardive ; grosse, bien arrondie, jaune & rouge-pourpre ; eau très-relevée ; commencement d'octobre.

Mignonne, Veloutée, grosse Mignonne ; grosse, jaune & rouge très-foncé, fine, fondante, délicate, sucrée, vineuse ; mi-septembre.

Incomparable en beauté ; même forme que la grosse Mignonne ; un peu plus ronde & plus brune ; mûrit peu après ; grande fleur.

Cardinale de Furstemberg ; grosse, ronde, très-rouge, fondante, excellente ; mi-sep.

Vineuse ; variété de la Mignonne, moins grosse, plus colorée, plus vineuse.

Bourdin, Narbonne ; autre variété ; mêmes grosseur, forme & couleur ; goût encore plus parfait.

Chèvreuse hâtive ; gros fruit un peu allongé, jaune & rouge-vif, sucré, agréable ; fin d'août.

Chancellière à grandes fleurs ; variété de la Chèvreuse ; fruit un peu moins allongé, plus sucré, meilleur, un peu plus tardif.

Pêche d'Italie ; autre variété plus grosse , plus pâle , plus tardive , plus succulente.

Chèvreuse tardive , mal nommée Pourprée ; autre variété plus abondante , fruit presque vert & beau rouge pourpre , excellent ; fin de septembre.

Admirable ; très-gros fruit , rond , jaune-clair & rouge-vif ; chair ferme , fine , douce , sucrée , vineuse , d'une bonté admirable ; mi-septembre.

Galande , Bellegarde , variété de l'Admirable , presque semblable en tout ; un peu plus hâtive.

Royale ; autre variété ; fruit moins arrondi , un peu moindre en grosseur , couleurs & qualités.

Admirable jaune , Abricotée ; autre variété très-féconde , même en plein vent ; gros fruit jaune un peu lavé de rouge ; chair ferme , jaune , un peu de goût d'abricot ; octobre.

Teton de Vénus ; autre variété ; fruit plus gros , moins arrondi , terminé par un gros mamelon ; goût très-fin & agréable ; fin de sept.

Nivette , Veloutée tardive : gros fruit , vert & rouge-foncé , velu , ferme , sucré , relevé ; fin de septembre.

Perlique ; très-fécond , même en plein vent , fruit allongé , anguleux , semé de petites bosses , d'un beau rouge ; excellent ; octobre & novembre.

Jaune-lisse ;

Jaune-lisse ; fruit petit , jaune & un peu rouge , sans duvet ; chair jaune , goût d'abricot ; mi-octobre.

Petite Violette : petit fruit violet clair & jaune-pâle , lisse , sucré , vineux , très-bon ; commencement de septembre.

Grosse Violette ; gros fruit moins vineux , plus tardif.

Brugnon violet musqué ; fruit moyen , violet ; chair adhérente au noyau , vineuse , musquée , sucrée , si le fruit est parfaitement mûr ; fin de septembre.

Pavie Madeleine , Pavie blanc ; fruit semblable à la Madeleine blanche ; chair dure , adhérente à la peau & au noyau ; commencement de septembre.

Pavie de Fomponne , Pavie rouge ; fruit le plus gros de sa famille ; blanc & beau rouge , musqué , sucré , vineux ; commencement d'octobre.

Pavie jaune ; fruit égal au précédent en grosseur , quelquefois supérieur en qualités.



POIRIER, *Pyrus*.

Amiré-Joannet ; petit fruit , pyriforme , jaune-citron , tendre , peu de goût ; fin de juin.

Petit Muscat , Sept-en-gueule ; la plus petite de toutes les poires , rouge-brun , demi-beurré , musqué ; fin de Juin. G

Muscato-Robert , Poire à la Reine ; moyen ,
pyriforme , vert-clair , tendre , sucré ; mi-
juillet.

Aurate ; petit , turbiné , jaune & rouge-clair ,
demi-beurré ; fin de juin.

Madeleine , Citron des Carmes ; moyen , tur-
biné , vert-clair , fondant , parfumé ; juillet.

Cuisse-Madame ; très-alongé , moyen , vert
& roux , demi-beurré , un peu musqué ;
fin de juillet.

Vermillon , Bellissime d'automne ; moyen ,
encore plus alongé , rouge-foncé , cassant ,
doux , relevé ; fin d'octobre.

Gros blanquet ; petit , pyriforme , blanc &
rouge-clair , cassant , sucré , relevé ; fin de
juillet.

Blanquet à longue queue ; fort petit , pyri-
forme , blanc , demi-cassant , sucré , par-
fumé ; commencement d'août.

Petit Blanquet , Poire à la perle ; petit fruit ,
forme de perle en poire , jaune très-pâle ,
demi-cassant , musqué ; fin de juillet.

Epargne , Beaupresent , S. Samson ; moyen ,
très-alongé , vert , fondant , peu relevé ,
le meilleur de la saison ; fin de juillet.

Ognonnet , Archiduc d'été ; moyen turbiné ,
jaune & rouge-vif , demi-cassant , goût
rosat & relevé ; commencement d'août.

Salviati ; moyen , rond , jaune & rouge-clair ,
demi-beurré , sucré , très-parfumé ; août.

Orange musquée ; moyen , rond , boutoné ,
jaune & rouge-clair , cassant , musqué ; août.

Orange rouge ; même forme , un peu plus
gros , gris & rouge-vif , cassant , sucré &
musqué ; août.

Bourdon musqué ; petit , rond , vert-clair ,
cassant , musqué ; juillet.

Poire de jardin ; gros fruit rond , boutoné ,
jaune & beau rouge , cassant , sucré , bon ;
décembre.

Orange d'hiver ; moyen , rond , boutoné ,
vert-brun , cassant , musqué : fév. & mars.

Martin-Sire : gros , beau , pyriforme , vert-
clair , cassant , doux & sucré : janvier.

Rousselet d'hiver : petit fruit pyriforme , vert-
foncé & rouge-brun , demi-cassant , à cuire :
février & mars.

Rousselet de Reims , petit Rousselet , *Pyrus
communis rufescens* : petit , pyriforme , rou-
ge-brun , demi-beurré , fin , très-parfumé :
fin d'août.

Rousselet hâtif , Poire de Chypre , Perdreau :
petit , pyriforme , jaune & rouge-vif taché
de gris , demi-cassant , sucré , très-parfu-
mé : mi-juillet.

Gros Rousselet , Roi d'été : moyen , pyriforme ,
vert-foncé & rouge-brun , demi-cassant ,
parfumé , peu fin : septembre.

Poire sans-peau , fleur de Guignes : moyen ,
pyriforme , vert & jaune tacheté de rouge ,

- fondant , parfumé : commencement d'août.
 Martin-sec : fruit moyen , pyriforme long ,
 isabelle & rouge , cassant , sucré , bon :
 novembre , décembre , janvier.
 Rouffeline : petit , pyriforme turbiné , couleurs
 plus claires que le précédent , demi-beurré ,
 sucré , musqué , agréable : novembre.
 Fondante de Brest , Inconnue Cheneau : moyen
 turbiné alongé , vert-gay & rouge clair ,
 cassant , sucré , relevé : commencement de
 septembre.
 Cassolette , Muscat vert , &c. petit , pyriforme ,
 vert-clair & rouge-pâle , tendre , sucré ,
 musqué : fin d'août.
 Bergamotte d'été , Milan de la Beuvrière :
 gros , turbiné , vert-gay & roux , demi-beurré ,
 peu relevé : commencement de septembre.
 Bergamotte d'automne : gros : turbiné , jaune
 & rouge-brun , beurré , sucré , doux , par-
 fumé : octobre , novembre , décembre.
 Bergamotte Suisse : moyen , turbiné : rayé de
 vert , de jaune , & de rouge : beurré , su-
 cré : octobre.
 Crafanne , Bergamotte Crafanne : gros , ar-
 rondi , gris-vert , très-fondant , sucré , re-
 levé , excellent : novembre , décembre , jan-
 vier.
 Bergamotte de Soulers : Bonne de Soulers :
 gros , pyriforme , jaune & rouge-brun ,
 beurré , fondant , sucré : fév. mars.

Bergamotte de Pâques ou d'hiver : plus gros , court turbiné , gris & roux , demi-beurré , peu relevé : janvier , février , mars.

Bergamotte de Hollande , Bergamotte d'Alençon , Amoselle : très-gros , turbiné arrondi , jaune-clair , demi-cassant , relevé , agréable : très-tardif.

Messire-Jean : gros , presque rond , varie de couleur , cassant , sucré , relevé , très-bon : octobre.

Robine , Royale d'été : petit , turbiné , court , jaune , demi-cassant , sucré , musqué : août.

Epine-Rose , Poire de Rose ; gros sphérique , jaune & rouge-clair , demi-fondant , musqué ; sucré , &c. comme l'Ognonnet ; août.

Double-Fleur ; gros , rond , jaune , bon à cuire en février , mars & avril.

Double-Fleur panachée ; variété rayée de vert & de jaune.

Bezi de Caissy , Rouffette d'Anjou ; petit fruit presque rond , jaune-brun , tendre , beurré , sucré , excellent ; nov. déc. janv.

Franc-Réal ; gros , renflé par le milieu , vert & roux , bon à cuire en oct. nov. déc.

Epine d'été , Fondante musquée ; moyen , pyriforme allongé , vert-pré , fondant , très-musqué ; commencement de septembre.

Poire-Figue ; moyen , très-allongé , vert-brun , fondant , doux & sucré ; commenc. de sept.

Epine d'hiver ; gros , allongé , vert-pâle , fon-

dant, doux, excellent, si le terrain lui convient ; nov. déc. janvier.

Ambrette ; moyen, ovale, blanchâtre, fin, fondant, sucré, relevé dans les terrains chauds ; nov. déc. janvier, février.

Echaffery, Bezy de Chaffery : presque mêmes grosseur, forme & couleur ; fondant, sucré, musqué ; nov. déc. janvier.

Sucré-vert ; fruit moyen, alongé, vert, beurré, sucré, bon ; fin d'octobre.

Royale d'hiver ; gros, pyriforme, jaune-clair & beau rouge, demi-beurré, sucré dans les terres chaudes ; déc. janv. février.

Muscato l'Alleman ; un peu ressemblant au précédent, gris & rouge, beurré, fondant, musqué, relevé ; mars, avril, mai.

Verte-longue, Mouille-bouche ; gros, alongé, vert, fondant, doux, sucré, bon ; commencement d'octobre.

Verte-longue panachée ; variété rayée de vert & de jaune.

Beurré, *Pyrus communis liquefcens* ; gros, fondant, très-beurré, fin, relevé, excellent, varie de couleur ; fin de septembre.

Bezy de Chaumontel ; gros, varie de forme & de couleur, demi-beurré, fondant, sucré, relevé, excellent ; nov. déc. janvier.

Angleterre, Beurré d'Angleterre ; moyen, ovoïde alongé, gris, demi-beurré, fondant, succulent ; septembre.

Angleterre d'hiver ; moyen , pyriforme , jaune citron , très-beurré , doux , un peu sec ; déc. janv. fév.

Orange Tulipée , Poire aux mouches ; grosse poire verte & brune , rayée de rouge-clair & marbrée de gris , demi-cassante ; comm. de septembre.

Bellissime d'été , Suprême ; petit fruit , beau-rouge & jaune rayé de rouge-clair , demi-beurré , peu relevé ; juillet.

Doyenné , Beurré blanc , Saint-Michel ; gros , oblong , jaune , très-beurré , très-sucré , quelquefois relevé , excellent ; octobre.

Doyenné gris ; moyen , gris , beurré , fondant , meilleur que le précédent : novembre.

Bezy de Montigny ; moyen , forme du Doyenné , jaune , très-fondant , musqué : commencement d'octobre.

Franchipanne ; moyen , long renflé par le milieu , beau jaune , demi-fondant , doux , sucré , parfum propre : fin d'octobre.

Jalousie ; gros , alongé , renflé , boutonné , roux , très-beurré , sucré , relevé , fort bon : fin d'octobre.

Bon-Chrétien d'hiver , *Pyrus communis Pompeiana* ; assez connu.

Angélique de Bordeaux ; gros , presque même forme que le précédent , plus pâle , cassant , ou tendre , doux & sucré : janv. fév.

Bon-Chrétien d'Espagne ; très-gros , pyrami-

- dal, jaune & beau rouge, cassant, doux ; bon à cuire en novembre & décembre.
- Gracioli, Bon-Chrétien d'été ; gros, pyramidal tronqué, bossu, jaune, demi-cassant, sucré, très succulent : commenc. de sept.
- Bon-Chrétien d'été musqué ; moyen, en poire de coing, jaune & rouge-léger, cassant, musqué : fin d'août.
- Manfuette, Solitaire : gros, pyramidal, peu régulier, vert & jaune, demi-fondant, bonté médiocre.
- Marquise : gros, pyramidal alongé, jaune, beurré, fondant, doux, sucré : nov. & déc.
- Colmart, Poire-manne : très-gros, pyramidal tronqué, vert & rouge-léger, beurré, fondant, sucré, relevé, excellent : janv. fév. mars.
- Virgouleuse : gros, alongé, jaune, tendre, beurré, relevé, excellent : nov. déc. janv. février.
- Saint-Germain : gros, pyramidal alongé, vert, fondant, succulent, excellent : depuis novembre jusqu'en avril.
- Louise-bonne : ressemble beaucoup au précédent, gros, blanc, demi-beurré, quelquefois bon ; décembre & janvier.
- Impériale à feuille de chêne : moyen, ressemblant à une petite Virgouleuse, inférieur en qualités : mars & avril.
- Pastorale, Musette d'automne : gros, très-

allongé, jaune, semé de roux, demi-fondant, un peu musqué, bon : oct. nov. déc.

Catillac; très-gros, pyriforme obtus, jaune & rouge-brun, âcre, à cuire depuis novembre jusqu'à la fin d'avril.

Bellissime d'hiver : plus gros que le précédent, presque rond, jaune & beau rouge; tendre, doux, moëlleux, à cuire : déc. janv. fév.

Trésor, Amour : très-gros, renflé, jaune-citron, tendre, doux, très-bon à cuire depuis décembre jusqu'en mars.

Tonneau : très gros, forme d'un petit tonneau, jaune & rouge vif, bon à cuire en février & mars.

Naples : moyen, forme de calebasse, jaune lavé de rouge-brun, demi-cassant, doux : février & mars.

Lansac : petit, presque rond, jaune, fondant, sucré, relevé : depuis oct. jusqu'en janvier.

Chat-brûlé; moyen, pyriforme allongé, jaune & beau rouge-vif, très-bon à cuire en fév. & mars.



P O M M I E R , *Malus.*

Calville d'été, Passe-pomme; petit fruit conique, à côtes, blanc & beau rouge, peu de saveur; commencement de juillet en compotes.

Passe-pomme rouge; petit, applati ou rac-

- courci , rouge-léger & rouge-vif ; peu relevé ; commencement de juillet en compotes.
- Calville blanche d'hiver ; très - gros fruit , jaune pâle & rouge-vif , fin , tendre , grenu , léger , relevé ; décembre , avril.
- Calville rouge d'hiver , *Pyrus malus Cavillea* ; très-gros fruit à côtes , rouge très-foncé , chair presque toute rose , fine , légère , grenue , vineuse : jusqu'à la fin de mars.
- Postophe d'hiver ; ressemble beaucoup au précédent , moins allongé , jaune & rouge-cérise ; goût agréable & relevé ; jusqu'en août.
- Violette ; fruit moyen , conique , jaune & rouge foncé , chair un peu teinte , sucré , parfumé de violette ; jusqu'en mai.
- Fenouillet gris , Anis ; petit , bien fait , ventre de biche , tendre , sucré , parfumé d'Anis ; décembre , janvier , février.
- Fenouillet rouge , Bardin ; moyen , gris-foncé & rouge-brun , plus ferme , plus sucré , plus relevé que l'Anis ; jusqu'en mars.
- Fenouillet jaune , Drap d'or : moyen , même forme , beau jaune & gris , ferme , délicat , doux , fort bon ; oct. & novembre.
- Pomme d'or , Gould-Pippin ; petit , couleur de drap d'or , ferme , sucré , très-relevé , excellente Reinette , jusqu'en mars.
- Reinette dorée , Reinette jaune tardive ; moyen , raccourci , gris-clair sur un fond jaune ,

ferme, sucré, relevé, peu acide; jusqu'en mars.

Reinette blanche, *Pyrus malus prafomilla*; moyen, abondant, jaune pâle, très-odorant, agréable; jusqu'en mars.

Reinette rouge; gros, raccourci, jaune très-clair & beau rouge, ferme, aigret; tardif.

Reinette de Bretagne; fruit moyen, rouge-foncé & rouge-vif tiqueté de jaune, ferme, sucré, peu acide; finit en décembre.

Reinette de Canada; très-gros, à côtes, jaune lavé de rouge, bon, peu acide; jusqu'en février.

Reinette franche; gros, applati, jaune, ferme, sucré, relevé, excellent; jusqu'en août.

Reinette grise; gros, applati, gris, ferme, sucré, fin, excellent: jusqu'en juillet.

Pigeonner: moyen, allongé, rouge rayé de rouge-foncé, fin, doux, agréable: jusqu'en décembre.

Pigeon, Jérusalem: petit fruit conique, couleur de rose changeante, fin, délicat, grenu, léger, très-bon: jusqu'en février.

Rambour franc: très-gros, très-applati, à côtes, jaune-pâle rayé de rouge, léger, aigret: bon à cuire en sept. & octobre.

Rambour d'hiver: mêmes forme & couleur, plus acide: bon à cuire jusqu'à la fin de mars.

Api, Long-bois : fort petit, jaune-pâle & beau rouge-vif, ferme, croquant, frais, peu d'odeur & de saveur : jusqu'en avril.
 Capendu : petit fruit, conique, rouge-pourpre & rouge-brun, tiqueté de fauve, aigrelet, bon : jusqu'à la fin de mars.



PRUNIER, *Prunus*.

De Catalogne, jaune hâtive : petit fruit allongé, jaune, sucré, commencement de juillet.
 Précoce de Tours : petit, ovale, noir, peu relevé : mi-juillet.
 Damas musqué, Prune de Malte, Prune de Chypre : petit, violet-foncé, ferme, musqué : mi-août.
 Damas violet : moyen, allongé, violet, ferme, sucré, un peu aigre : fin d'août.
 Damas de septembre, Prune de Vacances : petit oblong, violet-foncé, relevé, agréable : fin de septembre.
 Monsieur : gros, rond, beau violet, fondant, peu relevé : fin de juillet.
 Monsieur hâtif : semblable, violet plus foncé, mi-juillet.
 Royale de Tours : gros, presque rond, violet-clair & rouge-clair : fin, succulent, sucré, relevé : fin de juillet.

Grisse : ressemble au Monsieur : moins gros :
tout septembre.

Perdrigon blanc : petit, longuet, blanc, fondant, très-sucré, parfumé, excellent. Espalier : commencement de septembre.

Perdrigon violet : même forme, un peu plus gros, mêmes qualités. Espalier : fin d'août.

Perdrigon rouge : mêmes forme, grosseur & qualités, d'un beau rouge presque violet ; septembre.

Reine-claude, Dauphine, *Prunus compressa*. J. gros, sphérique, vert tiqueté de gris & de rouge, la plus excellente de toutes les Prunes : août.

Petite Reine-claude : inférieur en grosseur & en qualités, un peu plus tardif. Il a une souvariété à fleur semidouble.

Abricotée : gros fruit rond, vert un peu lavé de rouge, ferme, musqué, excellent : commencement de septembre.

Mirabelle : petit, rond un peu oblong, jaune-ambé, ferme, fort sucré : mi-août.

Variété à fleur semi-double.

Drap-d'or, Mirabelle double, petite, presque ronde, jaune tiqueté de rouge, fondante, sucrée, délicate, très-bonne : mi-août.

Impériale violette : gros fruit ovale, violet-clair, ferme, sucré, relevé : fin d'août.

Diaprée violette : moyen, alongé, violet, ferme, sucré, délicat, bon : comm. d'août.

Diaprée rouge, Roche-Corbon : presque mêmes forme & grosseur, rouge-cérise, ferme, succulent, sucré, relevé : commencement de septembre.

Impératrice blanche; moyen, oblong, jaune-clair, ferme, sucré, agréable; fin d'août.

Isle-vert; gros, très-allongé, bon en confitures; commencement de septembre.

Sainte-Catherine; moyen, allongé, jaune, sucré, très-bon; septembre & octobre.



VIGNE, *Vitis*.

Raisin précoce, de la Madeleine, Morillon hâtif, *Vitis vinifera præcox*, J. Petite grappe, très-petit grain, violet noir, peu de goût.

Chasselas, Bar-sur-Aube; grande grappe, gros grain rond, jaune d'ambre, fondant, doux, sucré, très-bon.

Chasselas musqué; un peu moins gros & plus tardif, vert, sucré, relevé de musc.

Cioutat, Raisin d'Autriche, *Vitis laciniosa*; feuille palmée ou laciniée; variété de Chasselas; grappes & grain plus petits, bon.

Muscat blanc; grosse grappe très-longue, conique; peau blanche, croquante, eau sucrée & musquée.

Muscat rouge; grain moins serré, gros, rouge-vif, musqué, moins bon; mûrit mieux que le blanc.

Le Muscat violet & le noir inférieurs en bonté.

Muscat d'Alexandrie, Passe-longue musquée ; peu de grains à la grappe , ovales , jaunes , musqué & très-bon , mûrit rarement.

Cornichon blanc ; peu de grains , très-longs , renflés par le milieu , blancs , doux , sucrés , très-bons ; mûrit rarement.

Cornichon violet ; mûrit encore plus rarement.

Corinthe blanc ; petite grappe alongée , très-garnie de fort petits grains ronds , jaunes , succulents , sucrés.

Bourdela , Verjus ; très-grosse grappe bien garnie de fort gros grains oblongs , jaune-pâle , pleins d'eau agréable dans leur maturité.



IV.

Arbres , Arbrisseaux & Arbustes de pleine terre.

ACACIA , Faux-Acacia , *Robinia pseudo-acacia* : arbre ; grappes de fleurs blanches odorantes , en mai.

Faux-Acacia sans épine , *Robinia pseudo-acacia inermis*.

Semences stratifiées , peu enterrées , en mars ; jeune plant craint le soleil ; plantez

peu avant en toute bonne terre , même sèche.
Acacia triacanthos, Févier d'Amérique, *Gleditzia triacanthos* : arbre ; fleurs très-peu éclatantes ; siliques singulières d'un beau rouge. Semences de Canada sur couche ; racines.

Acacia-Rose, *Robinia hispida* : arbrisseau précieux par ses belles fleurs couleur de rose. Greffer en fente ou en écusson , sur le Faux-Acacia.

Acacia de Constantinople *Linlibrizin*, ou Arbre de *Soye*, *Mimosa Linlibrizin*.

AGNUS-CASTUS, *Vitex Agnus-castus* : arbrisseau ; fleurs en juillet & août ; plusieurs variétés distinguées par les feuilles & par la couleur des fleurs. Semences , marcottes ; tout terrain.

Agnus-castus de la Chine, *Vitex Negundo* : petit arbuste : rarement s'élève de semences.

ALATERNE d'Espagne, *Rhamnus alaternus latifolius*. J. arbrisseau toujours vert.

Alaterne de Montpellier, *Rhamnus alaternus Monspelliacus*.

Alaterne à feuilles maculées de jaune.

Alaterne à feuilles bordées de blanc ; & autres variétés.

Semences : marcottes. Le bordé de blanc craint les fortes gelées.

ALIZIER, Alouchier, de bois, *Crataegus torminalis*.

Alizier

Alizier de Fontainebleau, *Crataegus latifolia*.

Alizier à feuille ronde & à feuille longue ,
blanches en dessous, *Crataegus Aria*.

Alizier nain du Mont-d'or, *Crataegus chamaemespilus*.

Petits arbres, beaux bouquets de fleurs
blanches au printems, & de fruits en au-
tomne. Semences; greffe sur franc ou sur
Aubépine.

ALTHÆA-FRUTEX, *Hibiscus Syriacus* : arbruste :
belles fleurs en été, blanches, rouges, vio-
let-pourpre.

Althæa-frutex à feuilles panachées.

Althæa-frutex à fleur double de la Chine, *Hibiscus Syriacus multiplex*.

Semences, marcottes, boutures, greffes
en fente sur franc.

AMANDIER commun à feuilles panachées,
Amygdalus communis variegatus.

Amandier à fleurs doubles, *Amygdalus flore pleno* : petit arbre; belles fleurs au printems.

Amandier du Levant à feuille satinée, *Amygdalus Orientalis. J.*

Amandier nain à fleur simple, *Amygdalus nana*.

Amandier nain à fleur double.

Petits arbustes. Greffe sur l'Amandier
commun; drageons du nain à fleur simple.

AMELANCHIER, *Mespilus Amelanchier* : arbris-
seau : fleurs blanches au printems : fruit bleu.

Amelanchier de Canada, *Mespilus Canaden-*

fis : fleurs blanches en épi. Semences : greffe sur épine.

AMORPHA, Indigo bâtard, *Amorpha fruticosa* : arbrisseau : fleur bleue en épi en juin. Semences, marcottes, boutures.

ANGELIQUE épineuse, *Aralia spinosa* : arbuſte : gros bouquet de fleurs, été, automne. Racines ; ombre ; humidité.

ANONIS, Arrête-boeuf, *Anonis fruticosa* : petit arbrisseau ; fleurs lie-de-vin, juin & juillet. Semences, marcottes ; terrain sec.

ARBOUSIER, FRAISIER en arbre, *Arbutus unedo* : arbrisseau toujours vert. Fruit ressemblant à une grosse fraise. Semences, marcottes, bon abri.

ARBRE de JUDÉE, Gainier, *Cercis filiquastrum*. Arbre moyen, fleurs rouges très-nombreuses. Semences.

Arbre de Judée à fleurs blanches, *Cercis filiquastrum album*.

Arbre de Judée de Canada, *Cercis Canadensis*. Greffe sur le commun.

ARBRE DE CIRE, *Myrica cerifera* : arbuſte à feuille odorante. Marcotte ; graines d'Amérique ; mieux en Orangerie.

—Mirthe du Brabant, ou Piment royal, *Myrica gale*.

ASCYRUM, *Hypericum Ascyrum* : arbuſte ; fleur jaune, été. Semences, drageons.

ASPERGE à feuilles piquantes, *Asparagus acu-*

risfolius : arbuste toujours vert ; fleur odorante. Semences ; œilletons.

AUBEPINE , *Crataegus Oxyacantha*.

Aubepine à fleur double , *Crataegus multiplex*.

Aubepine à fleur rouge , *Crataegus rosea*. J.

nouvelle variété.

Aubepine ou Epine de Glastonbury , *Crataegus oxyacantha biflora* : fleurit deux fois par an.

Greffes sur l'Aubepine.

AUNE , *Betula Alnus glutinosa* : grand arbre commun.

Aune à feuilles blanches en dehors , *Betula Alnus incana*.

Aune à feuilles découpées , *Betula Alnus laciniata*. J.

Semences , pieds éclatés.

AZEROLIER de Provence , ou d'Italie , *Crataegus Azarolus*.

Azerolier ~~de~~ de corail , *Crataegus coccinea*.

Azerolier de Canada , *Crataegus rutila*. J.

Azerolier Poire , *Pyrus dulcis*.

Petits arbres très-brillants par les fleurs au printemps , & les fruits en automne. Semences ; greffes sur épine , poirier , &c.

BAGUENAUDIER , *Colutea arborescens* : grand arbruste ; fleurs jaunes , printemps ; vessies rougeâtres.

Baguenaudier d'Alep , *Colutea Istria*.

Baguenaudier du Levant , *Colutea Orientalis*.

Semences , drageons , boutures.

BARBE-DE-RENARD, *Astragalus Tragacantha* :
petit arbuſte blanchâtre toujours vert. Se-
mences, terrain ſec.

BAUMIER de Gilead, *Pinus Balfamea* : grand
arbre toujours vert. Semences.

BIGNONIA, Jaſmin de Virginie, *Bignonia ra-
dicans*.

Petit Jaſmin de Virginie, *Bignonia radicans
minor*.

Arbuſte ſarmenteux, belles fleurs, fin de
juillet. Marcottes, boutures.

BOIS-BOUTON, *Cephalanthus Occidentalis* :
arbriffeau, fleur blanche en boule, été ;
difficile à multiplier, marcottes, boutures ;
ombre ; terre forte, humide.

BOIS-GENTIL, Bois-joli, *Daphne Mezereum* :
petit arbuſte, fleur rouge, fleur blanche,
odorantes, premier printems. Semences.

BONDUC, Chicot, *Guilandina dioica* : arbris-
ſeau ſingulier. Racines.

BOULEAU à canot de Canada, *Betula nigra*.

Bouleau Mériſier, *Betula lenta* : greſſe ſur le
Bouleau commun.

Bouleau commun, *Betula alba* : ſemences.

BOURREAU des Arbres, *Celaſtrus ſcandens* :
arbriffeau ſarmenteux : ſem. & marcottes.

BRUYERE commune, *Erica vulgaris* : très-pe-
tit arbuſte pour bordures ; fleur purpurine,
été ; terre ſablonneuſe ; reprend difficile-
ment en terrain cultivé.

Bruyère cendrée, *Erica cinerea*.

Buis en arbre, *Buxus sempervirens*.

Buis panaché de blanc.

Buis panaché de jaune.

Buis maculé.

Buis nain d'Artois, *Buxus sempervirens suffruticosa*. J.

Grand Buis de Mahon, feuille très-large, *Buxus Balearica*.

Semences, marcottes.

BUPLEVRUM, *Buplevrum fruticosum* : grand arbrisseau toujours vert, feuilles de Saule.

Semences, marcottes; terrain humide.

CAMELÉ, *Cnorum tricoccum* : arbruste toujours vert; fleur jaune, fleur rouge. Semences; bien exposer, abriter.

CAPRIER, *Capparis spinosa* : arbruste à grandes fleurs blanches. Semences; drageons; bien exposer, abriter; aime les platras & décombrés.

CATALPA, *Bignonia Catalpa* : arbre moyen; gros bouquet de fleurs purpurines odorantes, fin de juillet. Marcottes, boutures.

CEANOTHUS, *Ceanothus Americanus* : arbruste; fleur blanche, été. Semences, terrain sablonneux, humide, ombre.

CEDRE du Liban, *Pinus Cedrus* : grand arbre toujours vert.

Cèdre de Bermude, *Juniperus Bermudiana*.

Cèdre de Virginie, *Juniperus Virginiana*.

Semences; le jeune plant sensible au

froid se met en pleine terre la troisième année.

CERISIER à fleur double , *Cerasus multiplex*.

Cerisier à fleur semidouble , printems. Greffe sur Cerisier , ou Merisier.

CHAMÆCERISIER , *Lonicera Xylosteon* : arbuste à pet. fleur de Chevreuille , printems.

Chamæcerisier de Tartarie , *Lonicera Tartarica*.

Chamæcerisier à fruit noir , *Lonicera nigra*.

Chamæcerisier des Alpes , *Lonicera Alpigena*.

Chamæcerisier à fruit bleu , *Lonicera caerulea*.

Semences , marcottes , greffe.

CHAMÆDRIS en arbre , *Teucrium flavum* : arbuste toujours vert ; fleur jaunâtre en épi , été. Semences.

CHARME , *Carpinus Betulus* : arbre moyen.

Charme du Levant , *Carpinus Orientalis*.

Charme à fruit d'Houblon , *Carpinus ostrya*.

Plant de Charmille au cent ou au mille.

CHATAIGNIER , *Fagus Castanea sativa* : gr. arbre. Semences.

Châtaignier à gros fruit , Maronnier. Greffe en flûte sur franc , en mai.

CHÊNE , *Quercus Robur* : grand arbre. Semences.

Chêne-rouge de Canada , *Quercus rubra*.

Chêne à feuille de Châtaignier , *Quercus*

- Castanea folia*. Ces deux se greffent.
- Chêne-vert , *Quercus Ilex*.
- Chêne Liège , *Quercus Suber*. Semences.
- Chêne kermès , *Quercus coccifera*.
- CHEVREFEUILLE des bois , *Lonicera Periclymenum*.
- Chevrefeuille des jardins , *Lonicera Caprifolium*.
- Chevrefeuille rouge de Virginie , *Lonicera sempervirens*.
- Chevrefeuille Romain , *Lonicera Italica*.
- Chevrefeuille panaché à feuille de Chêne , *Lonicera Quercifolia*. Marcottes , dragéons.
- Le Chevrefeuille d'Italie est appelé par les jardiniers Chevrefeuille *sempervirens* , & cette dénomination lui convient , puisqu'il conserve ses feuilles en toutes saisons. Le rouge de Virginie , que M. Linnæus caractérise *sempervirens* , se dépouille pendant l'hiver en pleine terre.
- CISTE à feuille de Laurier , *Cistus laurifolius* : arbrisseau toujours vert ; fleur blanche , été. Semences.
- Ciste à feuille de Peuplier , *Cistus populifolius*.
- Ciste Ladanifere , *Cistus Ladaniferus* : fleur blanche , noirâtre au centre. Marcottes , boutures. Il faut bien exposer & abriter tous les Cistes ; mieux en Orangerie.
- CLEMATITE des bois , *Clematis vitalba* : arbris-

seau farmenteux à fleur bleue , à fleur blanche. Semences , drageons.

Clematite à fleur bleue double , *Clematis viticella*.

Clematite d'Orient , *Clematis Orientalis*. Drageons enracinés , marcottes.

CLETHRA à feuille d'Aune , *Clethra Alnifolia*.

CORMIER , Sorbier cultivé , *Sorbus domestica* : arbre ; bouquets de fleurs blanches en mai ; & de petits fruits pyriformes comestibles , en automne. Semences ; greffes sur épine , poirier , sorbier , coignassier.

CORNOUILLER sanguin , Bois-punais , *Cornus sanguinea*.

Cornouiller panaché , *Cornus sanguinea variegata*.

Cornouiller de Canada à bois rouge & fruit blanc , *Cornus alba*.

Cornouiller à feuille alterne , *Cornus alternifolia*.

Cornouiller mâle , à fruit rouge , *Cornus mascula*.

Cornouiller à fruit jaune , *Cornus mascula flava*.

Grands arbustes ; bouquets de fleurs blanches au printems. Semences , marcottes , traces , greffes sur franc.

COTONASTER , *Mespilus Cotonafter* : petit arbrisseau à fruit rouge. Semences ; greffe sur les Mespilus.

CYPRÈS mâle , *Cupressus expansa*. J.

Cyprès femelle, *Cupressus fastigiata*. J. Arbre toujours vert. Semences.

CYTISE des Alpes, Faux-Ebenier, *Cytisus Laburnum* : petit arbre ; grappes de belles fleurs jaunes en mai.

Cytise à large feuille, & longue grappe de fleurs odorantes, *Cytisus Laburnum latifolium* ; (se greffe sur le précédent).

Cytise de Montpellier, *Genista candicans*, (abriter en hiver).

Cytise, *Trifolium* des jardiniers, *Cytisus sessilifolius*.

Cytise velu, *Cytisus hirsutus* : fleur jaune-orangé : arbrisseaux. Semences, marcottes.

DIERVILLE, *Lonicera Diervilla* : arbrisseau ; grappes de fleur jaune-pâle ; fin de mai. Drageons.

EGLANTIER à feuille de Pimprenelle, *Rosa Pimpinella folia*.

Eglantier odorant, *Rosa Eglanteria*.

Eglantier toujours vert.

Marcottes, drageons, greffes.

EMERUS, *Securidaca* des jardiniers, *Coronilla Emerus* : arbrisseau à fleurs jaunes tachées de rouge, mai. Semences, drageons enracinés ; plus on le tond, plus il fleurit.

EPICIA, *Pinus abies* : grand arbre toujours vert. Semences.

EPINE à bouquet de Caroline, *Crataegus Caroliniana*.

Épine à feuille d'Erable , *Crataegus Acerifolia*.

Épine à feuille de Poirier , *Crataegus Pyrifolia*.

Épine de Glastombury , *Crataegus Glastomburiensis*.

Épine à long dard , *Crataegus aculeata*.

Épine luisante , *Crataegus Crus Galli*.

Épine de Pinchaw , *Crataegus tomentosa*. Semences ; greffe sur aubépine.

ERABLE des bois , petit Erable , *Acer campestre*.

Erable Sicomore , *Acer pseudoplatanus*.

Erable plâne , *Acer Platanoides*.

Arbres moyens. Semences.

Erable à sucre , *Acer saccharinum*.

Erable à feuille de Frêne , *Acer negundo*.

Erable de Virginie à feuille blanche en dehors , *Acer rubrum*.

Erable de Pensylvanie , *Acer Pensylvanicum*.

Erable Opale des Italiens , *Acer Opalus* , J.

Erable de Montpellier , *Acer Monspeffulanum*.

Erable de Crete , *Acer Creticum*.

Erable de Canada à bois jaspé , *Acer Canadense* , J.

Erable à feuille découpée , ou en patte d'oye , *Acer laciniifolium* , J.

Erable de Tartarie , *Acer Tartaricum*.

Marcottes ; greffe sur franc.

FABAGO , *Zygophyllum Fabago* : arbuſte ; fleur rougeâtre , juin. Semences , boutures.

FILARIA , *Phyllirea media*.

Elaria dentelé, *Phyllirea latifolia*.
Elaria à feuille étroite, *Phyllirea angustifolia* ;
 & plusieurs autres variétés :

Arbustes toujours verts. Semences, marcottes ; peu de soleil.

FRAMBOISIER de Canada, *Rubus odoratus* :
 arbrisseau, fleurs rose odorantes. Traces.

FRÊNE commun, *Fraxinus excelsior*.

Frêne à feuille arrondie, *Fraxinus rotundifolia*.

Frêne panaché, *Fraxinus excelsior variegata*.

Frêne à la mâne, *Fraxinus Ornus*.

Frêne de Caroline, *Fraxinus Caroliniana*.

Frêne à fleur, *Fraxinus florifera*. J.

Frêne de la nouv. Angleterre, *Frax. Americ.* J.

Frêne à feuille de Noyer, *Fraxinus juglandifolia*. J.

Arbres moyens, ou grands. Semences ; greffes ; terrain frais.

FRÊNE épineux, *Fagara*, *Zanthoxylum clava-Herculis* : arbre moyen. Marcottes, drageons.

FUSAIN, Bonnet de Prêtre, *Evonimus Europæus*.

Fusain à large feuille, *Evonimus latifolius*. J.

Fusain à fleur noirâtre, *Evonimus atropurpureus*.

Fusain galeux, *Evonimus verrucosus*.

Fusain toujours vert, *Evonimus Americanus*.

Arbustes. Semences, marcottes, drageons.

FUSTET, *Rhus Cotinus* : arbrisseau ; beau feuillage odeur de Citron ; fleur singulière. Pieds éclatés.

GALÉ , Piment Royal , *Myrica Gale* : arbruste , feuille odorante. Drageons , marcottes ; terrain humide.

GENÊT d'Espagne , *Spartium junceum*. J. arbrisseau à fleurs jaunes , printems & été. Semences.

Genêt à fleur double , *Spartium junceum multiplex*. Greffe.

Genêt à balay , *Spartium scoparium*.

Genêt à fleur blanche , *Spartium Lusitanicum*. J. très - rare.

Genêt de Syberie , *Genista Sybirica*.

Genêt des Teinturiers , *Genista tinctoria*.

Semences & greffes.

GENÊT épineux , Ajonc , Jonc-marin , *Ulex Europæus*. Voyez Plantes de grande culture.

GÉNÉVRIER commun , *Juniperus communis* : petit arbre toujours vert. Semences , ne levent que la deuxième année ; long & difficile à élever en terrain cultivé.

Génévrier (grand) , *Juniperus Phœnicea*.

Génévrier Cedre , *Juniperus Lycia*.

Génévrier Cedre de Virginie , *Juniperus Virginiana*.

Génévrier Cedre de Bermude , *Juniperus Bermudiana*. Semences.

GRENADIER (grand à fruit) *Punica granatum* : arbruste à belles fleurs rouges. Marcottes , drageons enracinés ; craint les fortes gelées.

GRENADILLE , fleur de la Passion , *Passiflora cærulea* : arbrisseau sarmenteux. Semences , marcottes , drageons ; espalier au midi ; bon abri pendant l'hiver.

GUAIACANA , Plaqueminier d'Italie , *Dyospiros lotus*.

Guaiacana de Virginie , *Dyospiros Virginiana* : petit arbre ; beau feuillage ressemblant à celui du Limonnier. Marcottes.

GUIMAUVE en arbre , *Lavatera olbia*. Semences sur couche au printems ; bien exposer ; abriter dans les froids.

HÊTRE , *Fagus sylvatica* : grand arbre. Semences.

Hêtre pourpre , *Fagus sylvatica purpurea*. Greffe.

Houx , *Ilex aquifolium* : arbusste toujours vert.

Houx hérisson , *Ilex aquifolium echinatum*.

— Grand nombre de variétés bordées , panachées , maculées de blanc , de jaune. Semences à l'ombre ; marcottes ; greffes sur franc , en mai & août.

Houx-frélon , ou fragon , *Ruscus aculeatus*. Semences , drageons.

HYDRANGEA , *Hydrangea arborescens* : arbusste , donne quelquefois des fleurs blanches en parassol. Marcottes , drageons.

JASMIN commun , *Jasminum officinale* : arbrisseau sarmenteux ; fleurs blanches odorantes , éré.

Jasmin panaché de blanc , de jaune , *Jasminum officinale variegatum*.

Jasmin jaune des bois , *Jasminum humile* : petit arbrisseau à fleur jaune.

Marcottes , drageons.

Jasmin de Virginie. Voyez Bignonia.

JASMINOÏDE , *Lycium Europæum* : arbrisseau à fleurs blanchâtres , rouges , &c. suivant la variété.

Jasminoïde de la Chine , *Lycium Sinense* , J. fleur bleuâtre.

Jasminoïde de la Chine , à large feuille , *Lycium Sinense latifolium* , J.

Tous meilleurs dans les remises que dans les jardins , parce qu'ils tracent beaucoup.

Jasminoïde du Pérou , odeur de Lilas , *Lycium Peruvianum* : espalier au midi : couvrir dans les gelées , qu'il craint encore plus que les autres Jasminoïdes.

IF , *Taxus baccata* : grand arbre toujours vert. Semences , marcottes.

ITEA de Virginie , *Itea Virginica*.

KALMIA à larges feuilles , *Kalmia latifolia*.

Kalmia à feuilles étroites , *Kalmia angustifolia*.

LAURÉOLE , *Daphne Laureola* : arbruste toujours vert. Semences , drageons.

LAURIER FRANC , *Laurus nobilis* : grand arbruste toujours vert. Semences , marcottes ; craint les fortes gelées.

LAURIER - CERISE , *Prunus Lauro-Cerasus* :

grand arbuste toujours vert ; grappes de fleurs blanches , printems.

Laurier-Cérise panaché de blanc , de jaune , *Prunus Lauro-Cerasus variegatus*. Semences , marcottes , greffes sur franc.

Laurier de Portugal , Azarero , *Prunus Lusitanica* : grand arbrisseau toujours vert. Semences , marcottes.

Laurier-Tin , *Viburnum Tinus* : arbrisseau toujours vert ; bouquets de fleurs blanches , automne , hiver , printems. Marcottes , drageons ; craint les grands froids.

Laurier Alexandrin , *Ruscus racemosus* : arbrisseau toujours vert , variété du Houx-Frélon. Semences , drageons.

Lierre , *Hedera helix* : arbrisseau toujours vert.

Lierre panaché , *Hedera helix variegata*.

Lierre en arbre.

Semences , marcottes.

Lilas blanc , violet , *Syringa vulgaris*.

Lilas de Marly , plus coloré , *Syringa vulgaris violacea*. J.

Lilas à feuille panachée de blanc , de jaune , *Syringa variegata* : arbrisseau de printems.

Lilas de Perse , *Syringa Persica* , à feuille entière , à fleur blanche , à fleur rouge.

Lilas de Perse à feuille découpée , *Syringa Persica laciniata*. J.

Arbuste ; marcottes , drageons.

MAGNOLIA , Laurier-Tulipier , *Magnolia grandiflora*.

Magnolia bleu, *Magnolia glauca*.

Magnolia rustique, *Magnolia acuminata*.

Magnolia ombrella, *Magnolia tripetala*.

Arbuste à grandes fleurs blanches odorantes. Semences, marcottes; bien exposer; mieux en Orangerie.

MAHALEB, Bois de Sainte-Lucie, *Prunus Mahaleb*: arbre moyen; petites fleurs blanches très-odorantes, printemps. Semences, marcottes, greffes sur MÉRISIER.

MARCEAU, *Salix caprea*.

Marceau panaché, *Salix variegata*.

Grand arbuste. Semences, marcottes, boutures.

MARONNIER d'Inde, *Æsculus Hyppocastanum*. Grand arbre à fleurs blanches au printemps.

Maronnier d'Inde panaché, *Æsculus Hyppocastanum variegatum*.

Semences; greffer le panaché.

MÉLÈSE d'Europe, *Pinus larix*: arbre: plusieurs variétés distinguées par la couleur du bois & du fruit.

Mélèse de Sybérie, *Pinus larix Sybirica*. J. plus tortueux.

Mélèse rouge d'Amérique, *Pinus larix rubra*. Semences, terre sablonneuse, ombre.

MELIANTHE d'Amérique, *Melanthus major*: arbuste, épi de fleurs rouges. Drageons; pied d'un mur au midi.

MÉRISIER

- MERISIER à fleur double, *Cerasus sylvestris multiplex* : arbre à belles fleurs blanches très-doubles, printems. Greffe sur Merisier.
- Merisier à grappes, *Prunus Virginiana* : petit arbre, fruit rouge, fruit noir. Semences, drageons, greffe.
- MICOCOULIER cominun, *Celtis Australis* : gr. arbre. Semences.
- Micocoulier du Levant, *Celtis Orientalis*.
- Micocoulier (grand), *Celtis Occidentalis*. Greffe ; bon terrein frais.
- MILLEPERTUIS en arbre, *Hypericum frutescens*. J. Arbrisseau à fleur jaune, juin & juillet.
- Millepertuis à odeur de Bouc, *Hypericum hircinum*.
- Millepertuis d'Espagne, *Hypericum Hispanicum*.
- Millepertuis de Kalme, *Hypericum Kalmianum*. Ombre ; terrein frais, sableux.
- MURIER blanc, *Morus alba* : petit arbre.
- Murier rose ou d'Italie, *Morus Italica*. J. Semences, marcottes.
- Murier à papier, de la Chine, *Morus papyrifera*.
- Murier de Constantinople, *Morus Constantinopolitana*.
- Murier de Canada, *Morus Canadensis*. Grand arbrisseau ; beau feuillage bien découpé, sur-tout dans la jeunesse. Racines.

NEFFLIER de Virginie, à feuille d'Arbousier,
Mespilus Arbutifolia. Semences, greffe sur
épine.

Nefflier des Alpes, *Mespilus Chamamespilus* :
petit arbrisseau; fleur rose en bouquet. Greffe
sur épine.

NEZ-COUPÉ, faux Pistachier, Patenotrier, *Staphylea pinnata* : arbruste à grappes de fleurs
blanches, en mai : fruit singulier.

Nez-coupé de Virginie, *Staphylea trifoliata*.
Semences, marcottes.

NOISETIER de Bisance; *Corylus Columna* : grand
arbre d'alignement. Greffe.

NOYER commun : *Juglans regia* : grand arbre
utile par le bois & le fruit.

Noyer de la Saint-Jean, *Juglans regia serotina*. J.

Noyer Pacannier, *Juglans oliveformis*. J.

Noyer noir, de Virginie, *Juglans nigra*.

Noyer noir, à fruit visqueux, *Juglans nigra aspera*. J.

Noyer blanc d'Amérique, *Juglans alba*.

Noyer ickeri, *Juglans compressa*.

Semences, greffes.

OBIER des bois, *Viburnum opulus* : arbruste ;
fleurs blanches, printems.

Obier Pimina des Anglois, *Viburnum Canadense*. J.

Semences, greffe, marcottes.

Obier double, Boule de neige, Rose de Guel-

dre, *Viburnum opulus sterilis*. J. Marcottes;
drageons.

OLIVIER franc, *Olea Europæa sativa*. J. Semences, marcottes, éclats; bien exposer; couvrir dans les grands froids.

OLIVIER de Bohême, *Eleagnus angustifolia*: petit arbre; petites fleurs jaunes très-odorantes, en juin. Marcottes, boutures.

ORME, *Ulmus campestris*: grand arbre.

Orme à large feuille, *Ulmus latifolius*. J. Semences, marcottes, drageons.

(Le jeune plant se vend au millier par mélange.)

Orme d'Amérique, feuille blanche en dehors;
Ulmus Americanus. J.

Orme crénelé de Sybérie, *Ulmus polygama*.

—Thé de l'Abbé Galois, *Ulmus pumila*.

OSIER bleu, *Salix glauca*.

Osier jaune, *Salix vitellina*.

Osier rouge, *Salix rubens*.

Semences, marcottes, boutures.

PALIURE, Porte-chapeau, Argalou, *Rhamnus Paliurus*: arbrisseau épineux; fleurs jaunes odorantes, en juin & juillet; graines singulières. Semences & marcottes.

PAVIA rouge, *Æsculus Pavia*.

Pavia jaune, *Æsculus flava*.

Grand arbuste. Semences; greffe sur Maronnier d'Inde.

PÈCHER à fleur double, *Amygdalus Persica multiplex*.

Pêcher à fleur semidouble portant fruit : belles fleurs au printems.

Pêcher nain , *Amygdalus Persica pumila*.
Gresse.

PÉRIPLOCA , *Periploca Græca*. Plante sarmenteuse propre pour les tonnelles ; fleurs abondantes , en juillet. Semences , drageons.

PEUPLIER blanc des bois , & Blanc de Hollande , *Populus alba*.

Peuplier Tremble , *Populus tremula*.

Peuplier d'Athènes , *Populus Athenæa*.

Peuplier noir , *Populus nigra*.

Peuplier noir d'Italie , *Populus nigra Italica*.

Peuplier liard , *Populus viminea*. J.

Peuplier Baumier , Tacamahaca , *Populus balsamifera*.

Peuplier de Caroline , *Populus Heterophylla*.

Peuplier de Virginie , *Populus Virginiana*. J.

Grands arbres. Marcottes , boutures , drageons ; terrain frais ou humide.

PHLOMIS , *Phlomis fruticosa* : sous-arbrisseau fleur jaune , été. Semences ; le plant fleurit la deuxième année.

PLATANE d'Orient , Main-découpée , *Platanus Orientalis*.

Platane d'Occident , ou de Virginie , *Platanus Occidentalis*.

Platane à feuille d'Erable , *Platanus Acerifolius*. J.

Beaux arbres. Semences , marcottes , boutures ; terrain frais.

PIN, *Pinus sylvestris*.

Pin Pignon, *Pinus Pinæa*.

Pin du Lord Weimouth, *Pinus Strobis*.

Pin d'Ecosse, *Pinus Pinaster*.

— Plusieurs autres variétés dont les noms sont incertains.

Grands arbres toujours verts. Semences à l'ombre.

POIRIER à fleur double, *Pyrus communis multiplex*. N. Greffe.

POMMIER d'Astracan, toujours vert, *Pyrus malus sempervirens*. J.

Pommier odorant, *Pyrus malus coronaria*.

Pommier odorant de Sybérie, *Pyrus malus Hybrida*. J.

Fort - petits arbres.

POMPADOURA, *Calycanthus floridus* : arbrisseau ; fleur purpurine, été. Marcottes ; bon terrain frais, ombre.

POURPIER de mer, *Atriplex Halimus* : arbrisseau toujours vert. Marcottes, boutures.

PRUNIER à fleur double, *Prunus infistitia multiplex*. N. Greffe.

PTELEA, *Ptelea trifoliata* : arbrisseau ; fruit singulier. Semences, marcottes.

PYRACANTHA, Buisson ardent, *Mespilus Pyracantha* : bel arbruste par ses bouquets de fleurs blanches au printems, & de fruits rouge-vif en automne. Semences, marcottes.

QUINTEFEUILLE en arbruste, *Potentilla fruti-*

cosa : fleur d'un beau jaune , en mai. Drageons.

RAGOUMINIER , *Prunus Canadensis* : petit arbuste ; fleur blanche , printems. Marcottes , greffe.

RADOU , ou Redoul des Provençaux , *Coriaria Myrsifolia* : arbuste. Drageons.

RAISIN de mer , *Ephedra distachia* : arbrisseau sarmenteux. Drageons , marcottes.

RHAMNOÏDE , *Hyppophae Rhamnoïdes* : arbrisseau ; feuille argentée. Semences , drageons , boutures.

RHODODENDRON, petit Laurier-Rose des Alpes
Rhododendron ferrugineum.

Rhododendron (grand) , *Rhododendron maximum*.

Arbuste à fleur rouge odorante ; fable noir , humide ; ombre.

ROMARIN , *Rosmarinus officinalis* : arbrisseau toujours vert.

Romarin panaché de jaune , *Rosmarinus variegatus*.

Marcottes , boutures , pieds éclatés ; ferrer le panaché.

RONCE à fleur double , *Rubus fruticosus multiplex*.

Ronce à fleur double de Saint-François , sans épines , *Rubus inermis*. J.

Marcottes , drageons.

ROSIER à cent feuilles , *Rosa centifolia*.

- Rosier de Bordeaux, *Rosa centifolia minor*. N.
 Rosier moussieux, *Rosa muscosa* : l'enveloppe
 de la fleur est garnie de mousse.
 Rosier de Bourgogne, *Rosa Burgundiaca* ;
 fleur la plus petite, plus rouge au centre
 que par les bords.
 Rosier de Meaux, de Champagne, grosse
 Bourgogne, *Rosa Meldensis*. N.
 Rosier Princesse, Rose-ponceau, *Rosa rubi-*
ginosa. JACQ. jaune en dedans, rouge
 en dehors.
 Rosier jaune, *Rosa lutea*. J.
 Rosier jaune double, *Rosa lutea multiplex*.
 Rosier Cannelle, *Rosa Cinnamomea*.
 Rosier à gros-cul, *Rosa Francofurtensis*. J.
 Rosier des quatre saisons, fleur rouge, fleur
 blanche, *Rosa semperflorens*. J.
 Rosier de Hollande, *Rosa maxima*. J.
 Rosier de Provins, *Rosa Gallica*.
 Rosier de Provins, grosse double, *Rosa Gal-*
lica inodora multiplex. N.
 Rosier de Provins, petite double, *Rosa Gal-*
lica inodora multiflora. N.
 Rosier à fleur panachée d'Angleterre, *Rosa ver-*
ficolor. J.
 Rosier sans épines, à fleur simple, *Rosa alpina*.
 Rosier sans épines, à fleur double, *Rosa al-*
pina multiplex.
 Rosier Muscat, ou d'Alexandrie, simple,
 double, *Rosa moschata*. J.

Rosier à fleur blanche , *Rosa alba* , &c. &c.

Marcottes , drageons , greffe sur franc.

SABINE mâle , femelle , *Juniperus Sabina*.

Sabine panachée , *Juniperus Sabina variegata*. J.
arbusse toujours vert. Marcottes , boutures ;
ombre.

SAPIN , *Pinus Picea*.

SAPINETTE blanche , *Abies brevifolia*. J.

Sapinette noire , *Abies purpurascens*. J.

Sapin à feuille d'If , *Abies Canadensis*. J.

Arbres toujours verts. Semences.

SAULE commun , *Salix alba*.

Saule de Babylone , du Levant , du Grand-
Seigneur , pleureur , *Salix Babylonica*.

Saule odorant , à feuille de Laurier , *Salix
pentandra*.

Saule à feuille de Myrthe , *Salix Myrsinites*.

Saule de Saint-Léger , *Salix arenaria*. Ces
deux derniers ne sont que de petits arbustes
rampants.

Marcottes , boutures , greffes ; terrain hu-
mide.

SENEÇON en arbrisseau , *Baccharis Halimifolia*.

Marcottes , boutures , bon terrain frais.

SNAUDRAP des Anglois , Arbre de neige , *Chio-
nantus virginicus* : arbrisseau ; fleur blanche ,
en été. Greffe sur Frêne ; bon terrain.

SORBIER des oiseaux , *Sorbus aucuparia*.

Sorbier de Laponie , *Sorbus aucuparia Hybridæ* :
petit arbre ; beaux bouquets de fleurs blan-

ches au printems. Semences ; greffe sur les Mespilus.

Souci en arbre , *Othonna cheirifolia* : arbruste toujours vert. Marcottes , boutures ; mieux en pot.

Spiræa à feuille de Saule , fleur blanche ; *Spiræa Salicifolia alba. J.*

Spiræa (le même) à fleur rouge , *Spiræa Salicifolia purpurea. J.*

Spiræa à feuille blanche en dehors , *Spiræa tomentosa.*

Spiræa à feuille de Millepertuis , *Spiræa Hypericifolia.*

Spiræa crénelé , *Spiræa crenata.*

Spiræa à feuille d'Obier , *Spiræa Opulifolia.*

Jolis arbrustes à fleurs, en mai & juin. Marcottes , drageons enracinés.

Sumac à feuille d'Orme , Rouvre des Corroyeurs , *Rhus coriaria* ; fleur blanc-sale.

Sumac de Virginie , *Rhus Typhinum* : panicule rougeâtre.

Sumac de Canada , à feuilles blanches en dehors , & panicule verdâtre , *Rhus Canadense. J.*

Semences & traces.

Sumac à fleur verte , *Rhus viridiflorum.*

Sumac à bois lisse , *Rhus glabrum.*

Sureau commun , *Sambucus nigra*

Sureau panaché de blanc , de jaune , *Sambucus nigra variegata.*

Sureau à fruit vert , *Sambucus nigra virescens*. J.

Sureau à feuille découpée , *Sambucus nigra laciniata*.

Sureau à grappes , *Sambucus racemosa*.

Arbrisseaux à fleurs blanches , en juin. Semences , marcottes , boutures.

SYMPHORICARPOS , *Lonicera Symphoricarpos* : arbruste ; fleurs en septembre. Traces.

SYRINGA , *Philadelphus coronarius* : arbrisseau à fleurs blanches trop odorantes , en mai & juin.

Syringa nain , *Philadelphus humilis*. J. arbruste ; fleurit rarement. Drageons.

TAMARISC d'Allemagne , *Tamariscus Germanica*.

Tamarisc de Narbonne , *Tamariscus Narbonensis*. Arbrisseaux verts. Marcottes ; boutures ; terrain léger.

THÉ à foulon du Japon , *Psoralea glandulosa* : arbrisseau ; épis de fleurs violettes , été. Semences , bon terrain ; bonne exposition ; abri dans les gelées.

THUYA de Canada , Arbre de vie , *Tuya Occidentalis* : arbre toujours vert. Semences , marcottes ; terrain humide.

Thuya de la Chine , *Tuya Orientalis*. Semences ; tout terrain.

THYMELEE des Alpes , *Daphne Cneorum* : petit arbruste ; belles fleurs purpurines odorantes , premier printems & automne. Marcottes ;

quelquefois semences aussi-tôt leur maturité.

TILLEUL des bois, *Tilia Europea*.

Tilleul de Hollande, *Tilia Hortensis*. J.

Tilleul de Canada; à larges feuilles, *Tilia Americana*.

Grands & beaux arbres. Semences, marcottes.

TOUTE-SAINE, *Hypericum Androsimum* : arbuste à fleur jaune, été. Dragons.

TOXICODENDRON, *Rhus Toxicodendron* : arbre caustique & dangereux à toucher. Dragons.

TROENE, *Lygustrum vulgare* : arbrisseau à grappes de petites fleurs blanches au printemps; presque toujours vert. Semences, marcottes, dragons.

TULAPIER de Virginie, *Loriodendron Tulipifera* : bel arbre par son feuillage, & ses fleurs de forme de Tulipes renversées. Semences de la Louisiane; marcottes.

VERNIS du Japon, *Rhus Succedaneum* : bel arbre, pousse vigoureusement. Traces.

Vernis (vrai), *Rhus vernix* : grand arbrisseau.

VIORNE, Coudre moinsine, *Viburnum Lantana*.

Viorne panaché, *Viburnum Lantana variegata*.

Viorne à feuille dentelée, *Viburnum dentatum*.

Viorne à feuille de Poirier, *Viburnum Pyrifolium*.

Viorne à feuille de Prunier, *Viburnum Prunifolium*.

Viorne à belle feuille, *Viburnum lentago*.

Viorne nudiflore, *Viburnum nudum*.

Viorne à feuille de Cassiné, *Viburnum Cassinoides*.

XYLOSTEON, *Lonicera Pyrenaïca* : arbruste à fleurs couleur de chair, fin de mai. Marcottes, greffes ; terrain léger.

YUCCA de pleine terre, *Yucca gloriosa* : fleurs blanches en cloche, juin & juillet. Drageons enracinés ; terrain sablonneux.



V.

Arbres, Arbrisseaux, & Plantes d'Orangerie.

ACACIA de Farnèse, Cassie du Levant, *Mimosa Farnesiana* : feuilles d'un beau vert : fleurs jaunes odorantes. Semences des Pays méridionaux, en terrine sur couche.

ADATHODA, Noyer des Indes, *Justicia Adathoda* : beau feuillage ; fleurs blanches. Marcottes, boutures en mai ; eau.

ALOËS Perroquet panaché, *Aloë variegata*.
Aloës pitte.

Aloës puant.

Aloës à épines molles ; & plusieurs autres variétés.

ANAGYRIS, Bois-puant, *Anagyris foetida* : fleurs jaunes, en mai & juin. Semences du Languedoc.

AZEDARAC, Lilas des Indes, *Melia Azedarach* : grappes de fleurs odorantes d'un violet tendre, en juin & juillet.

Azedarac (grand), *Melia Azadirachta* : plus grand dans toutes ses parties ; fleurit plus rarement. Semences, drageons.

BAGUENAUDIER d'Ethiopie, *Colutea frutescens* : sous-arbrisseau trifennuel ; jolies fleurs. Semences, drageons.

BARBA-JOVIS, *Anthyllis Barba Jovis* : feuilles de Faux-Acacia ; épis de fleurs d'un violet-foncé parsemé de points jaune-doré. Marcottes, boutures, drageons.

BRUYERE du Cap de Bonne-Espérance, *Phyllica ericoïdes* : très-joli arbrisseau ; fleurs blanches tout l'hiver. Marcottes, boutures.

CAROUBIER, *Ceratonia Siliqua* : arbruste toujours vert, peu arroser. Marcottes.

CAMARA, *Lantana aculeata* ; quatre variétés distinguées par les couleurs des fleurs, en septembre & octobre. Il est plus sûr de le semer tous les ans, & de le traiter en plante ann. parce qu'il ne passe bien l'hiver qu'en serre chaude.

CARACOLLE, *Phaseolus Caracalla* : arbruste grimpant ; fleur rose & blanche odorante, automne. Marcottes, boutures.

CHAMÆDRIS à odeur de Pomme de Reinette ;

Teucrium odoratum : pet. pl. Pieds éclatés.

CISTE à feuille de Sauge, *Cistus Salvifolius* :
fleur blanche.

Ciste crépu, fleur rouge, *Cistus crispus*.

Ciste incane, fleur rouge, *Cistus albidus* ; bel-
les & grandes fleurs à la fin de mai. Se-
mences.

CORONILLE, *Coronilla glauca* : sous-arbris-
seau à fleurs jaunes odorantes. Semences,
marcottes.

FICOÏDE à doigt d'enfant, *Mesymbrianthemum*
verruculatum : & plusieurs autres especes
distinguées par les feuilles & les fleurs ;
plantes grasses. Boutures des feuilles ; terre
seche.

GERANIUM, Bec-de-grue, en arbrisseau, fleur
couleur de Cerise, gros bois, grande fleur,
Geranium inquinans.

Geranium couleur de feu & violet, *Geranium*
Zonale.

Geranium à fleur en papillon, grande feuille
de Mauve, fleur striée, *Geranium papilio-*
naceum.

Geranium à feuille en entonnoir, panicule de
fleurs gris-de-lin, *Geranium cucullatum*.

Geranium à odeur de Carline, *Geranium cu-*
cullatum majus.

Geranium à feuille de Lierre, *Geranium pel-*
tatum.

Geranium à feuille de Vigne , fleur gris-de-lin , *Geranium vitifolium*.

Geranium Rosa des jardiniers , fleur rouge , *Geranium capitatum*.

Geranium visqueux , fleur gris-de-lin mouche-tée , *Geranium viscosum*. J.

Geranium à odeur d'épice , *Geranium odoratissimum*.

Geranium triste , fleur rembrunie peu apparente , d'une odeur très-agréable , *Geranium triste*.

Semences sur couche ; boutures en mai ; eau.

GRENADIER à fleur double , *Punica granatum multiplex*.

Grenadier à petite fleur double.

Grenadier nain d'Amérique , *Punica nana* : fleurs simples , très-nombreuses.

Marcottes , drageons ; greffe sur franc.

GUIMAUVE d'Espagne en arbre , *Lavatera olbia* : fleur rose. Semences. Cet arbrisseau passe quelquefois en pleine terre.

HELIOTROPE du Pérou , *Heliotropium Peruvianum* : jolie plante vivace à fleurs en aigrettes violet-tendre , odeur de Vanille , été , automne , hiver. Semences au printems , peu couvertes , toujours entretenues humides ; marcottes , boutures.

JASMIN d'Espagne , *Jasminum grandiflorum* : belles fleurs blanches , le revers rouge. Mar-

cottes , boutures , greffe en fente sur le Jasmin commun.

Jasmin Jonquille , *Jasminum odoratissimum* : fl. jaunes odorantes. Semences , marcottes.

Jasmin d'Arabie , ou des Indes , *Nyctanthes Sambach* : fleurs blanches odorantes ; mieux en serre chaude.

Jasmin des Açores , *Jasminum Azoricum* : petites fleurs blanches odorantes. Marcottes.

IMMORTELE du Levant , *Gnaphalium Orientale* : sa fleur se conserve très-long-tems. Boutures.

Petite Immortelle jaune odorante , ou Stachas citrin , *Gnaphalium Stacas*.

Semences , boutures.

LAURIER Rose , *Nerium Oleander* : arbruste toujours vert à fleurs rouges.

Laurier Rose à fleurs blanches.

Laurier Rose à fleur double , *Nerium Oleander odoratum*. J.

Marcottes , pieds éclatés.

LUSERNE en arbre , *Medicago arborea* : arbrisseau à feuille blanchâtre , fleur jaune. Semences , marcottes.

MARJOLAINE à coquille , *Origanum Smyrneum* : jolie plante vivace ; fleurs peu apparentes. Boutures , pieds éclatés.

MAUVE en arbre , *Lavatera arborea* : passe quelquefois en pleine terre en bonne exposition. Semences.

MELIANTHE

MELIANTHE d'Afrique, *Melianthus minor* : arbrisseau; fleurit rarement. Boutures & dragons.

MYRTHE Romain, *Myrthus communis Romana*.
Myrthe à fleur double, *Myrthus communis multiplex*.

Myrthe moyen, *Myrthus communis Belgica*.
Myrthe moyen panaché, *Myrthus Belgica variegata*.

Myrthe de Tarente à feuille d'If, *Myrthus communis mucronata*.

Semences, marcottes, boutures, greffe.

ORANGER Citronnier, *Citrus Medica*.

Oranger Cedrat, *Citrus medica Cedra*.

Oranger Lime douce, *Citrus medica Limon*.

Oranger de Florence, *Citrus Limon Florentinus*.

ORANGER Sauvageon, *Citrus aurantium*.

Oranger de Portugal, *Citrus Olyssyponense. J.*

Oranger Bigarade couronnée, *Citrus coronatum. J.*

Oranger Bigarade violette, *Citrus violaceum. J.*

Oranger Riche-dépouille, *Citrus multiflorum. J.*

Oranger Turc, *Citrus lunatum. J.*

Oranger Chinois, *Citrus Sinense. J.*

Oranger Pompoleum, ou Pompadour, *Citrus Pompoleum. J.*

Oranger Bergamotte, *Citrus Bergamium. J.*

Oranger Pampelmous, *Citrus Pampelmous*.

&c. &c. Greffe en écusson.

PERVENCHE de Madagascar , *Vinca Rosea* ; plante vivace à fleurs très-brillantes , presque toute l'année : elle ne passe qu'en serre chaude ; plus sûr de la traiter en plante annuelle , & de la semer tous les ans.

QUEUE de Lion , *Phlomis Leonurus* : joli arbrisseau ; fleurs aurore verticillées. Marcottes , boutures ; peu arroser en hiver ; placer au soleil sur le devant de la serre.

SOLANUM de Buenos-Aires , *Solanum Bonariense* : arbruste à belles fleurs blanches , tout l'été.

Solanum amomum , *Solanum pseudocapsicum* : arbrisseau à beaux fruits rouges. Semences , marcottes , drageons.

TARASPIC d'hiver , *Iberis semperflorens* : pl. vivace à fleurs blanches presque toute l'année. Marcottes , boutures.

TREFLE bitumineux , *Psoralea bituminosa* : sous-arbrisseau à fleur bleue , presque toute l'année. Semences.

Nous enrichirions ce Chapitre d'un fort grand nombre d'autres Arbrisseaux & Plantes , si dans les climats qui ne sont pas plus tempérés que Paris , ils pouvoient facilement passer l'hiver dans l'Orangerie ; où il sera prudent de serrer la plupart des Arbrisseaux & Arbustes du Chapitre précédent que nous avons recommandé d'abriter & de bien exposer.

V I.

Graines d'usage en nature.

ABSINTHE, *Artemisia Absinthium*.
 Ache, *Apium graveolens*.
 Ache de Montagne, *Ligusticum levisticum*.
 Agnus-castus, *Vitex Agnus-castus*.
 Aigremoine, *Agrimonia Eupatorium*.
 Alpisste, *Phalaris Canariensis*.
 Ammi, *Ammi majus*.
 Ancholie, *Aquilegia vulgaris*.
 Anet, *Anethum graveolens*.
 Angélique, *Angelica Archangelica*.
 Anis, *Pimpinella Anisum*.
 Armoise, *Artemisia vulgaris*.
 Arroche, *Artiplex hortensis*.
 Asperge, *Asparagus officinalis*.
 Bardane, *Arctium lappa*.
 Basilic, *Ocimum Basilicum*.
 Baume du Pérou, *Trifolium Melilotus cærulea*.
 Bourrache, *Borrago officinalis*.
 Buglose, *Anchusa officinalis*.
 Camœline, *Myagrum sativum*.
 Carotte sauvage, *Daucus Carota*.
 Cartame, *Carthamus tinctorius*.
 Carvi, *Carum Carvi*.
 Chardon béni, *Centaurea benedicta*.
 Chardon à foulon, *Dipsacus fullonum campestris*.

- Chêne (glands), *Quercus Robur*.
 Chervis, *Sium Sifarum*.
 Chicorée, *Cichorium endivia*.
 Chou, *Brassica oleracea*.
 Ciguë, *Conium maculatum*.
 Citron (pepin), *Citrus medica*.
 Concombre sauvage, *Momordica Elaterium*.
 Coriandre, *Coriandrum sativum*.
 Cresson alenois, *Lepidium sativum*.
 Cumin, *Cuminum Cyminum*.
 Daucus de Crete, *Athamanta Cretenfis*.
 Epine-vinete, *Berberis vulgaris*.
 Epurge, *Euphorbia Lathyrus*.
 Faine (fruit du Hêtre), *Fagus Sylvatica*.
 Fenouil doux, *Anethum Fœniculum*.
 Fenouil de Florence, *Anethum Florentinum*.
 Fenugrec, *Trigonella fœnum græcum*.
 Frêne, *Fraxinus excelsior*.
 Gaude, *Reseda Luteola*.
 Génivière, *Juniperus communis*.
 Gremil, *Lithospermum officinale*.
 Guimauve, *Althea officinalis*.
 Hieble (fruit & graine mondée), *Sambucus
Ebulus*.
 Houblon, *Humulus Lupulus*.
 Houx (bayes), *Ilex Aquifolium*.
 Julienne, *Hesperis Matronalis*.
 Jusquiame, *Hyoscyamus niger*.
 Laitue, *Lactuca sativa*.
 Larme de Job, *Coix Lachryma Jobi*.
 Lavande, *Lavandula Spica*.
 Laurier (bayes), *Laurus nobilis*.
 Lierre, *Hedera Helix*.

- Lin, *Linum usitatissimum*.
 Lupin, *Lupinus albus*.
 Lys (oignon), *Lilium candidum*.
 Marjolaine, *Origanum Majorana*.
 Mauve, *Malva rotundifolia*.
 Melisse, *Melissa officinalis*.
 Millepertuis, *Hypericum perforatum*.
 Millet, *Panicum miliaceum*.
 Moldavique, *Dracocephalum Moldavica*.
 Myrthe (bayes), *Myrthus communis*.
 Navet sauvage, *Brassica Napus*.
 Nerprun, Gr. d'Avignon, *Rhamnus infectorius*.
 Nielle sauvage, *Agrostema Githago*.
 Œiller à ratafia, *Dianthus Caryophyllus*.
 Orange (pepins), *Citrus Aurantium*.
 Orme, *Ulmus campestris*.
 Orobe, *Orobis vermis*.
 Ortie blanche, *Lamium album*.
 Ortie noire, *Urtica dioica*.
 Ortie Romaine, *Urtica pilulifera*.
 Orvalle, *Salvia Sclarea*.
 Panais sauvage, *Pastinaca sylvestris*.
 Panis, *Panicum Italicum*.
 Patience, *Rumex Patientia*.
 Pavor blanc, *Papaver somniferum album*.
 Pavot œillette, *Papaver somniferum nigrum*.
 Persil, *Apium Petroselinum*.
 Persil de Macedoine, *Bubon Macedonicum*.
 Piment, *Capficum grossum*.
 Pin, *Pinus Pinæa*.
 Pivoine mâle, *Pæonia officinalis mascula*.
 Pivoine femelle, *Pæonia officinalis foeminea*.
 Plantain, *Plantago major*.

Pois chiche blanc, *Cicer arietinum*.
 Pois chiche rouge de Provence.
 Pourpier vert, *Portulaca oleracea*.
 Psillium, *Plantago Psillium*.
 Rave, *Brassica rapa*.
 Ricin, *Ricinus communis*.
 Romarin, *Rosmarinus officinalis*.
 Roquette, *Brassica Eruca*.
 Rue, *Ruta graveolens*.
 Scarole, *Cichorium endivia latifolia*.
 Sénévé, *Sinapis nigra*.
 Sefeli de Marseille, *Sefeli tortuosum*.
 Soleil, *Helianthus annuus*.
 Staphisaigre, *Delphinium Staphisagria*.
 Sureau, *Sambucus nigra*.
 Talitron, *Sisymbrium Sophia*.
 Tanaisie, *Tanacetum vulgare*.
 Thé du Mexique, *Chenopodium ambrosioides*.
 Thim, *Thymus vulgaris*.
 Tilleul, *Tilia Europæa*.
 Tlaspi, *Thlaspi campestre*.
 Troëne, *Ligustrum vulgare*.
 Verveine, *Verbena officinalis*.
 Violette, *Viola odorata*.
 Violier jaune, *Cheiranthus cheiri*.



Semences froides mondées.

MELON, *Cucumis Melo*.
 Concombre, *Cucumis sativus*.
 Courge, *Cucurbita lagenaria*.
 Citrouille, *Cucurbita Pepo oblongus*.
 Potiron, *Cucurbita Pepo rotundus*.

V I I.

Fourages & Plantes de grande culture.

THIMOTY des Anglois, gr. Massette, *Phleum pratense*. Labourez, & ameublissez bien un terrain humide ou même marécageux. Depuis mars jusqu'à la fin de septembre semez quatre livres de graine par arpent (de 900 toises quarrées) mêlée avec de la terre ou du sable, parce qu'elle est très-fine; ou avec trois boisseaux d'Avoine; ou avec de l'Esclourgeon, si vous semez à la fin de l'été. Hersez légèrement, afin que la graine soit peu recouverte.

On fauche deux fois par an, aussi-tôt que l'épi commence à paroître, ce fourage très-abondant, & excellent pour les chevaux, & tous les bestiaux, qu'on peut laisser paître dans le pré après la seconde coupe. Une prairie de Thimoty dure au moins 12 ans.

RAY-GRASS d'Angleterre, Fromental d'Angleterre, Pain-vin, *Lolium perenne*. Tout terrain, sec, humide, froid, argilleux, pierreux, sablonneux, &c. convient à cette Graminée; mais elle réussit & produit incomparablement davantage dans un bon terrain. Ceux qui lui donneront un sol trop médiocre n'en doivent espérer qu'un médiocre succès. Elle mérite d'occuper les meilleures terres, étant d'un

très-grand produit ; étant une des meilleures nourritures pour le bétail , & sur-tout pour les moutons , en vert , en sec , en pâture ; son foin (fauché dès-que l'épi est formé) étant très-agréable & très-sain aux chevaux , à qui il donne du feu ; étouffant toutes les mauvaises herbes ; pouvant se couper en vert dès le mois d'avril , grande ressource pour le bétail dans certaines années. Les Anglois bons œconomes font de Ray-grass la plus grande partie de leurs prés & de leurs pâturages.

Le terrain étant bien labouré , dressé , herfé , semez au printems ou en automne 50 livres au moins de graine par arpent (si le terrain n'est que médiocre , il faut plus de graine. Pour cette plante , comme pour toutes les autres , plus le terrain est mauvais , plus il faut de semence) ; hersez & roulez. Si vous vous proposez de faucher au printems & en été , & de faire pâturer les chevaux & le gros bétail en automne , après avoir semé le Ray-grass , semez par dessus 3 livres de grand Trefle rouge , & une livre de petit Trefle blanc ; mais à part , & non mêlées avec la graine de Ray-grass , parce qu'étant beaucoup plus fines , elles ne pourroient se répandre également. Si vous ne voulez faire pâturer que des moutons , ne semez point de Trefle rouge , mais 4 liv. de Trefle blanc. Le Ray-grass empêche le mauvais effet que produit quelquefois le Trefle donné seul). Vous pouvez faire trois coupes par an , si vous ne faites point paître en automne. Le Ray-grass subsiste très-long-

temps, & est d'un rapport étonnant, s'il est en bon terrain, & fumé ou engraislé tous les trois ans pendant l'hiver. Il fait de fort beaux gazons, en doublant la quantité de semence.

RAY-GRASS de France, Fromental de France, *Avena elatior*. Il se cultive comme celui d'Angleterre; ne sert point au pâturage, mais fournit d'excellent foin en grande abondance. Il faut environ 80 livres de graine par arpent. On peut le semer mêlé avec de l'Avoine ou du Trefle noir; mieux avec du Sain-foin (60 livres de Fromental & 4 boisseaux de Sain-foin).

Ces deux fourages se nommant Ray-grass, ou Fromental, ceux qui nous en demanderont de la graine voudront bien expliquer si c'est celui de France, ou celui d'Angleterre qu'ils demandent.

GRANDE-PIMPRENELLE, *Poterium Sanguisorba*. Quoiqu'on dise que cette Plante vient dans les plus mauvais terrains, nous ne conseillons point de faire des frais de culture & de semence dans un sol qui à peine les rendroit: cette observation n'est pas pour la Pimprenelle seule. Elle réussit bien dans un terrain médiocre; beaucoup mieux dans un bon. Elle dure au moins 20 ans; se fauche quatre ou cinq fois par an, & se pâture tout l'hiver; par conséquent est d'un très-grand produit. Le bétail peut en manger tant qu'il veut, en vert, ou en sec; elle le nourrit, rafraîchit,

engraisse. Il ne faut cependant le laisser entrer dans le champ que quand la rosée est passée.

Entre plusieurs méthodes de culture, la plus facile & la plus pratiquée, est de semer la Pimprenelle au printems, ou mieux en automne, comme on sème l'Avoine, & de la herfer de même. Douze livres de graines suffisent pour un arpent. Si le terrain n'est pas humide, il est bon de semer après une pluie. Le plant étant fortifié, on en arrache dans les endroits trop touffus pour regarnir les endroits vuides, s'il s'en trouve. Les engrais ne sont pas nécessaires.

POMME DE TERRE, *Solanum tuberosum*. Le grand rapport des Pommes de Terre, & leur utilité pour la nourriture des hommes & des animaux sont assez connus.

Un terrain bon ou amélioré par des engrais étant bien labouré & façonné; entre la fin de février & la fin d'avril, un laboureur y ouvre un rayon avec la charue; une personne avec un semoir ou panier rempli de Pommes de Terre entières, ou coupées par morceaux garnis d'un ou plusieurs yeux, si elles sont grosses, suit la charue, & à chacun de ses pas, qu'il fait de 18 à 20 pouces, il laisse tomber une Pomme de Terre dans le rayon. Le laboureur en revenant fait un second rayon qui recouvre les tubercules: le semeur le suit, sans semer dans ce rayon, mais avec le pied il jette de la terre sur les Pommes de Terre que la charue peut avoir

manqué de recouvrir. Il semera dans le troisième rayon , & on observera le même ordre dans toute la plantation : de sorte que les Pommes de Terre se trouveront à 18 pouces ou 2 pieds de distance en tout sens. On peut aussi les planter à la houe ou à la bêche dans de petites fosses de 6 à 7 pouces de profondeur ; on rejette dessus deux ou trois pouces de terre.

Le plant ayant 6 ou 8 pouces de hauteur , il faut le rechauffer. En juin ou juillet il est très-avantageux de le butter de nouveau ; car de chaque œil des tiges enterré , il sort des racines & des tubercules : ainsi plus ces plantes sont buttées , plus elles produisent.

On recolt les Pommes de Terre en octobre ou novembre , avant les gelées auxquelles elles sont fort sensibles. On les conserve dans une cave ou une serre inaccessible à la gelée , ou en terre dans des fosses profondes , recouvertes de trois pieds au moins de terre.

Il y en a plusieurs variétés ; de grosses , de petites , de longues , de rondes , de rouges , de blanches , de pâles , &c.

BLED NOIR de Tartarie , Sarasin de Tartarie , *Poligonum Tartaricum*. Ce Bled Noir étranger est plus branchu que le nôtre , plus garni d'aigrettes de grain , moins sensible aux gelées blanches , plus fort contre les vents & la pluie qui le renversent rarement , parce que la tige est presque pleine. Le grain est plus dur , plus pesant , de meilleure qualité pour tous les usages ; se conserve plusieurs années

sans s'échauffer, sans contracter de mauvais goût ni de mauvaise odeur, & sans être attaqué par le Charançon.

Il se sème un peu plutôt ou plus tard, suivant que le pays est plus ou moins méridional, depuis la mi-juin jusqu'à la fin de juillet; & réussit dans tous les terrains, & à toute exposition, plus ou moins suivant la qualité, les engrais, & les préparations de la terre.

RABIOULE, Turnep, Tornep, gros Navet, *Brassica Rapa*. La Rabioule, qui paroît être la Rave des Anciens, est le plus gros de tous les Navets, ayant jusqu'à 25 ou 26 pouces de tour. La culture en est d'autant plus avantageuse, qu'elle est peu dispendieuse; que le produit est excessif; que ce Navet est une excellente nourriture pour le bétail, & sur-tout pour les vaches dont il rend le lait aussi abondant & meilleur dans l'hiver qu'au mois de mai; qu'il supplée avec avantage aux autres fourrages dans la saison où ils sont fort rares; qu'il divise & prépare bien les terres à recevoir le blé; qu'enfin il préserve les bestiaux de la plupart des maladies que leur cause le trop long usage des fourrages secs. Dans toute terre à blé, pourvu qu'elle ne soit ni dure ni pierreuse, mieux dans les terrains légers amendés, profonds, on sème 4 livres de graine par arpent sur le chaume, qu'on herse & qu'on roule ensuite; ou mieux sur un labour, qu'on herse & qu'on roule après avoir semé. On peut employer moins de semence; mais comme en juin &

juillet , tems de cette semaille , les pucerons font périr beaucoup de jeune plant , souvent on est obligé de résemencier. Lorsque le plant pousse la cinquième ou sixième feuille , il faut l'éclaircir , & il est très-bon de le biner & sarcler. Environ un mois après il sera très-utile de faire un second binage , & un nouvel éclaircissement , afin que le plant soit à 12 ou 14 pouces au moins de distance. A la fin de septembre on peut couper les feuilles , les donner aux bestiaux. En octobre on arrache les Navets ; on les met dans un lieu à l'abri des gelées ; on les donne à manger coupés par morceaux plus ou moins gros , suivant l'espèce de bétail. Quelques cultivateurs les font consumer par les moutons sur le terrain même , sans les arracher.

CHOU Turnep , Chou de Laponie , *Brassica Laponica*. Ce Chou - Rave connu depuis peu d'années , présente les mêmes avantages que la Rabioule ; mais il paroît préférable à plusieurs égards. Il résiste aux plus grands froids. Les fortes gelées n'interrompent point sa végétation ; de sorte que ses feuilles se coupent trois fois dans l'hiver , & durent jusqu'à la fin d'avril. Ces feuilles nourrissent mieux qu'aucun autre fourrage , & même engraisent toute espèce de bétail , vaches , cochons , moutons , &c.

En octobre retournez par un labour le chaume de blé ou d'avoine ; en mars donnez un second labour ; jusques vers la fin de mai

donnez encore deux façons, & hersez. Il seroit bon de fumer entre les deux premiers labours; nulle récolte ne paie mieux la dépense des engrais.

Au printems semez la graine sur couche (environ 3 onces pour arpent). Vers le commencement de juin plantez le jeune plant dans le terrain préparé, en rayons faits à la charue, espacé d'environ 2 pieds en tout sens; sarcliez & binez. Vous pourrez commencer à couper en novembre ou décembre.

CHOU à Vaches, *Brassica Vaccina*. Dans les cantons où la pâture est rare pendant l'été, ce Chou est d'une grande ressource. On sème la graine en juillet ou août; on met en place le jeune plant avant l'hiver, ou au printems, en bonne terre fumée, à 18 ou 22 pouces de distance en tout sens. Il naît sur la tige (qui s'allonge jusqu'à 7 ou 8 pieds) un grand nombre de feuilles. A mesure qu'elles acquièrent leur grandeur, on les cueille, & on les donne aux vaches dont elles augmentent beaucoup le lait; on les hache grossièrement, on les saupoudre de son, & on met le tout dans des lavures ou du lait écrémé, pour nourrir les cochons; on les donne de même aux dindons, canards & autres volailles, mais hachées plus menu; enfin lorsque l'hiver a attendri les feuilles, on les met au pot, & elles sont plus agréables à manger que celles de la plupart des autres Choux-verts, parce qu'elles n'en ont jamais le goût de musc. Pendant un an entier

il ne cesse de produire des feuilles. Au printemps il monte en graine, on réserve le nombre qu'on destine à cet usage; on mange les autres comme brocolis; ils sont assez bons.

CAROTTE, *Daucus Carota*. Les anciens près défrichés, les terrains frais ou même un peu humides, sablonneux, & très-profonds sont les plus propres pour la Carotte. Un labour très-profond avant l'hiver, un second léger après l'hiver, dresser & bien herster le terrain, y semer la graine depuis la mi-mars jusqu'à la mi-avril, suivant que la terre est plus légère ou plus forte, à la volée, ou en rayons espacés de 10 à 12 pouces; bien rouler, ou marcher; sarcler, éclaircir le plant s'il est trop épais. (On peut pendant l'été couper deux fois les feuilles pour les donner aux bestiaux). Avant les grands froids, vers la fin de décembre, arracher les Carottes, par un tems sec, les mettre dans une serre ou cave à couvert des fortes gelées; ou creuser une fosse de 7 à 8 pieds de profondeur en terrain sec; y ranger les Carottes par lits séparés avec un peu de paille; rejeter par dessus une épaisseur de 3 ou 4 pieds de la terre de la fouille bien marchée & foulée. Personne n'ignore combien la Carotte est propre à engraisser & à nourrir tous les animaux, & comment on l'emploie à ces usages, tant cuite que crue. Les chevaux mêmes s'en accommodent fort bien.

ESCOURGEON, Orge carrée, *Hordeum hybernum*. Le terrain étant préparé comme pour les autres Orges, on sème celle-ci en octobre ou en novembre, 15 ou 16 boisseaux par arpent. Elle fournit aux bestiaux la première verdure après l'hiver, excellente pour les vaches, & pour les chevaux, tant en vert qu'en sec. Elle se coupe deux ou trois fois jusqu'au mois d'août. Si on la cultive pour le grain, pour la nourriture des hommes, ou pour faire la bière, on ne la coupe point en vert. Elle mûrit avant tous les autres grains, & est d'un grand secours aux pauvres jusqu'à la moisson. La graine ne se conserve bonnes à semer qu'un an.

SOUCRION, Orge nud, *Hordeum distichum nudum*. Autre variée d'Orge, qui se cultive comme l'Orge commune. Son grand produit, & son grain très-farineux la fait estimer dans plusieurs provinces.

SPERGULE, *Spergula arvensis*. Dans un terrain préparé par un labour, & le mieux uni que vous pourrez, semez 10 ou 12 liv. de graine (moins dans un bon terrain;) enterrez-la avec des branches d'épine au lieu de herse; en mars ou avril, si vous voulez de la graine, qui se recolt en juillet & août; en août, si vous ne voulez que du fourage vert pour la pâture qui fait le meilleur effet à toute espèce de bétail, & sur-tout au menu bétail. Le fourage sec, quoique de mauvaises couleur & odeur,

odeur , est préféré au meilleur foin par les chevaux , bœufs , vaches , & moutons ; il est difficile à sécher & à fanner. La graine est excellente pour les volailles & pigeons. Le produit de la Spergule dans les bons terrains est presque incroyable.

AJONC, Jonc-marin, Jan , *Ulex Europæus*. L'usage le plus commun de l'Ajonc qui se nomme aussi Lande , Genêt épineux , est pour former des haies & clôtures. Mais dans les cantons où l'on ne fait ni prairies ni pâtures artificielles , ses jeunes pousses hachées & pilées font une fort bonne nourriture pour les bétails & sur-tout pour les chevaux. On consacre à cet arbrisseau un coin de terrain mauvais ou médiocre , dans lequel on sème au mois de mars la graine mêlée avec les menus grains qu'on recolté dans leur saison ; l'Ajonc ne se coupe que la seconde année. Lorsque les pieds deviennent forts , on les coupe presque rez-terre en août ou septembre , afin qu'ils produisent de jeunes pousses pour l'hiver. L'Ajonc se sème encore fort bien sur les revers des fossés. Lorsqu'on veut détruire une Jannière , on l'arrache , on la laisse sécher , on y met le feu. Les cendres fertilisent admirablement le terrain.

LUZERNE, *Medicago sativa*. Tout le monde connoît l'abondance & la bonté de la nourriture que la Luzerne fournit à tout le bétail. Un terrain gras , frais , léger , profond , lui con-

vient : elle peut y subsister de 12 à 20 ans. Ce terrain bien labouré, façonné, engraisé, s'il en a besoin, hersé, & sur-tout nettoyé de chiendent & de mauvaises herbes, avec lesquelles elle ne peut subsister, on y sème en mars ou avril avec demi-semence d'avoine 18 ou 20 livres de graine de Provence, ou environ 25 de celle de nos cantons. (Dans les terrains les moins exposés à la gelée & aux mauvais vents, on préfère de la semer seule en août ou septembre, afin de faucher dès l'été suivant). On récolte la seconde année, mais elle n'est en plein rapport que la troisième. Elle se fauche trois ou quatre fois par an, par le plus beau tems, aussi-tôt qu'elle est fleurie, à moins qu'on ne veuille recueillir de la graine. Les bestiaux & même les volailles ne doivent jamais entrer dans la Luzerne.

LUPULINE, Trefle noir, *Medicago Lupulina*.

C'est une espèce de Luzerne commune dans les prés : seule elle fait une très-bonne pâture pour engraisser tous les bestiaux, sans les échauffer ou très-peu. Dans un terrain gras & humide, elle se fauche trois fois par an dès-qu'elle est fleurie. Le Pain-vin qui se trouve presque toujours mêlé avec, ne diminue rien de son produit ni de sa qualité. On la sème au printemps ou en automne : de six à sept boisseaux de graine par arpent.

TREFLE de Hollande, *Trifolium pratense*. La terre étant préparée comme pour la Luzerne,

on sème la graine seule, depuis mars jusqu'au commencement de mai. Outre la qualité & l'abondance de ce fourage, qui se fauche trois ou quatre fois par an par le plus beau tems, parce qu'il sèche difficilement, il a encore le mérite d'améliorer les terres, soit qu'on l'y laisse trois ans (qui font sa durée), soit qu'on ne le laisse qu'un ou deux ans dans les terrains qu'on veut faire reposer, & auxquels il fournit un bon engrais pour le froment qui lui succède.

SAIN-FOIN, *Hedysarum Onobrychis*. Le Sain-foin appétissant, nourrissant, donne beaucoup de lait aux vaches; pourvû qu'elles ne le mangent pas pour toute nourriture, parce qu'il engraisse les bestiaux. Le terrain étant façonné, on sème en mars ou avril de 15 à 18 boisseaux de graine par arpent. Il se fauche une fois la première année pour le faire tanner, & trois fois les autres années, fort tendre, sur-tout dans les bons terrains où les tiges deviennent fort grosses, & seroient trop dures en sec. Il dure 10 ou 12 ans dans les fonds médiocres, plus dans les bons. Il est étonnant combien il améliore les terres, sur tout celles qui sont sablonneuses.

LENTILLE, *Ervum Lens*. Dans un terrain sans engrais, même maigre, argilleux, mieux sableux, graveleux, préparé par un bon labour, semez après la mi-mars jusqu'à la mi-avril un boisseau & demi de Lentilles à la volée par

arpent (si les Lentilles sont très-bonnes , lisses , luisantes , pèsantes , un boisseau suffit). Faites passer la herse & le rouleau. Lorsqu'elles seront mûres , vous les couperez , les laisserez sécher par petits tas sur le champ , les battrez. Nulle paille ne convient mieux aux brebis que celle de la Lentille : elle est excellente pour tout l'autre bétail. Si vous voulez un foin de qualité bien supérieure , fauchez la Lentille dès-que le grain des premières filiques est mûr ; étendez sur le champ ; laissez bien sécher ; battez légèrement ; la plupart des feuilles & des filiques avec leur grain demeurera attaché à la paille. Mais ce foin , & la Lentille en vert ne doivent être donnés aux bestiaux que par mesure ; parce que les mangeant avec excès & avec trop d'avidité , ils pourroient en être malades.

VESCE, *Vicia sativa*. On peut semer la Vesce avant l'hiver dans les climats tempérés. Nous la semons après l'hiver comme les Mars dans une terre préparée par deux labours , épiercée & roulée. Elle ne se coupe en vert que dans la disette. Fauchée lorsque la graine est mûre (cette graine nourrit les pigeons , & se mêle avec l'avoine des chevaux) , le foin est de peu de valeur. Mais si vous la coupez avant que la graine soit mûre , c'est un excellent fourage , qu'il faut bien fanner & sécher. Si l'on destine ce fourage pour la nourriture des bœufs & des vaches , on sème ordinairement de l'avoine avec la Vesce , & on fauche l'ua

& l'autre avant la maturité du grain. Le produit d'une pièce de bonne terre semée en Vefce, est étonnant.

SAFRAN, *Crocus officinalis*. Dans un terrein bien ameubli, léger, noir, sablonneux, on plante depuis mars jusqu'en juillet les oignons de Safran automnal, (qui se multiplient beaucoup tous les ans) à un pouce environ de distance l'un de l'autre, en sillons espacés de demi-pied, & profonds de cinq ou six pouces. S'il ne leur survient point de maladies, ils n'exigent aucun soin jusqu'à la récolte des fleurs qui se fait en septembre ou octobre. C'est un gros objet de commerce qui doit inviter à le cultiver ceux qui ont des terrains convenables.

ALPISTE, *Phalaris Canariensis*. L'Alpiste, dont les épis ou le grain sont une nourriture très-agréable aux fereins & autres oiseaux, se sème comme tous les petits grains de Mars, en terre meuble.

SORGO, Millet d'Inde, gros Mil d'Italie, *Holeus Sorghum*. Sa graine étant plus grosse que celle du Millet commun, il est plus profitable; même culture; veut de l'humidité, des terres & des années chaudes; très-bon pour les oiseaux de volière & de basse-cour.

MILLET, *Panicum Miliaceum*; & petit Millet ou Panis, *Panicum Italicum*. Ces deux Gra-

minées , qui servent à-peu-près aux mêmes usages , suivant les pays , pour la nourriture des hommes & des oiseaux , se cultivent de même , & se sement fort clair en avril & mai dans une terre douce & légère bien labourée & herfée. Il faut bien recouvrir la semence ; & éclaircir le plant un mois après sa levée.

FROMENT de Smirne , *Triticum æstivum palmatum*. On le sème comme le Froment ordinaire , & dans la même saison ; veut un bon terrain substantieux : semé en mars il mûrit dans les années chaudes. Son grain est rarement attaqué de la carrie.

MAÏS , Bled de Turquie , *Zea Mays*. Les usages du Maïs pour la nourriture des hommes varient dans chaque pays : par - tout c'est le meilleur grain pour nourrir la volaille , les cochons & les pigeons. Dans un terrain médiocre , ou mauvais , mieux bon & bien façonné , on le sème en mars ou avril par rayons ; grain à grain , ou par touffes , il n'importe , pourvu qu'il y ait assez de distance pour donner quelques binages.

GARANCE , *Rubra Tinctorum*. Il y a peu de cultures dont le produit égale celui des Garancières. Cette plante réussit très-bien dans une terre douce , légère , humide en dessous ; dans une bonne terre sablonneuse sur un fond de glaise ; quelquefois dans une terre assez améliorée avec du fumier de bœuf & de va-

che. Si l'on veut semer dans un terrain cultivé, les mêmes façons que pour le froment fuffissent. Si c'est un terrain en friche, il faut donner, tant devant qu'après l'hiver, assez de labours pour le bien ameubler. On sème environ deux boisseaux de graine par arpent en mars ou avril; on herse; & quand la plante est levée, on la sarcle. La première année on récolte la graine, & on butte un peu chaque pied; la seconde année on fait une autre récolte de graine: & vers le mois de novembre de la même année on commence à arracher les plus grosses racines; les autres la troisième année: & on peut en tirer de petits tronçons garnis chacun d'un tubercule, pour faire de nouvelles plantations. Le détail de tous les soins qu'exige une Garancière seroit trop long.

SOYEUSE, Ouatte, *Asclepias Syriaca*. La culture de cette espèce d'Apocin est devenue intéressante, depuis qu'on en a tiré de la Ouatte, & qu'on a trouvé le moyen de filer les aigrettes de ses fruits avec de la soie. Elle est vivace, se contente des plus mauvais terrains, se sème au printems, & commence à produire la troisième année; n'exige plus ensuite aucune culture.

COLSA, *Brassica arvensis*. C'est une espèce de Chou fort cultivé en Flandres, où il fait un objet considérable de commerce. On fait de l'huile avec sa graine comme avec la Navette. Les pains dont on a exprimé l'huile

servent à engraisser toutes sortes de bétail, qui mange aussi la menue paille du Colza qui sort du van. Il se sème au printemps, & se plante comme les Choux dans une terre profonde & bonne ou amendée par des engrais, à 6 ou 8 pouces de distance, par rangs espacés d'environ un pied. Ou bien on sème quatre ou cinq livres de graine par arpent : lorsque le plant est assez fort, on l'éclaircit ; & dans un autre terrain préparé on arrange le plant qu'on a arraché dans des sillons à la charue, qui le recouvre à son retour, comme nous avons expliqué dans la culture des Pommes de Terres. Il donnera sa graine l'année suivante. Quelquefois on le cultive pour fougage, comme le Chou à vaches.

LIN de Riga, *Linum usitatissimum*. Tout le monde connoît l'utilité du Lin ; peu de personnes en ignorent la culture. Dans une terre grasse ou amendée, meuble ou ameublie, nettoyée de toutes racines de mauvaises herbes, point trop humide, on sème la graine en mars par un beau temps. Si l'on veut avoir de belle filasse fine & douce, il faut environ 190 livres de graine par arpent. Si l'on préfère de récolter de la linette & que l'on sème en terre forte, 150 livres de graine seront suffisantes ; mais le plant étant plus clair, les riges seront plus grosses & plus ligneuses, & la filasse moins fine ; comme il arrive au Lin d'hiver. Car dans nos provinces méridionales, & même basse Normandie, on sème

beaucoup de Lins en septembre & octobre. L'hiver les éclaircit, ils deviennent plus forts & meilleurs pour graine que ceux de mars, mais ceux-ci leur sont préférables pour la filasse. La graine étant semée, il faut herser & passer le rouleau; depuis que le plant a deux pouces jusqu'à ce qu'il en ait six, il faut le sarcler plusieurs fois. Il ne faut le cueillir que lorsqu'il est près de la maturité. Trop vert, ou trop mûr, la filasse est moins fine, & il donne beaucoup d'étoupes.

La meilleure Linette se tire de Riga; c'est celle que nous fournirons aux cultivateurs.

CHANVRE de Piémont, *Cannabis sativa gigantea*. Il se cultive comme le Chanvre commun; mais il doit être fort clair, car il acquiert 7 ou 8 pieds de hauteur, & étend beaucoup ses branches. Sa plus grande utilité est la graine, qu'il donne dans une abondance prodigieuse. C'est pourquoi il faut le semer dans le commencement du printemps: au lieu que le chanvre qu'on cultive principalement pour la filasse, se peut semer depuis mars jusqu'à la fin de juin.

Manière de semer les beaux Gaxons.

LA terre étant bien labourée, épierrée, émotée, dressée au rateau fin, recouverte d'un ou deux pouces de bonne terre étendue bien également, semez, (en toute saison, excepté dans les grands froids & les grandes sécheresses;

mieux le printems & l'automne; en septembre ou octobre, si le terrain est sec) des graines des bas prés, par un tems couvert; recouvrez au rateau; ou mieux, si l'étendue n'est pas très-grande, répandez bien également demi-pouce de bonne terre ou de terreau. Sarclez exactement, sur-tout la première année; & si vous arrachez quelques grosses touffes, comme il s'en trouve souvent, répandez une pincée de graine & couvrez avec un peu de terre; tondez & roulez souvent; arrosez dans les sécheresses; tous les ans jetez-y un peu de graine, pour regarnir & renouveler. Sans tous ces soins, on ne peut avoir de beaux Gazons.

Pour les grands Tapis d'agrément, on emploie le FIN-HOUSSY, joli petit Trefle blanc. Dans un terrain bien préparé, & le mieux dressé qu'il est possible, en sème environ 30 livres de graines par arpent, mieux au printems. Plus on le tond, plus il fleurit, & plus sa verdure est gaie, même dans les plus grandes sécheresses. C'est pourquoi nos Jardiniers en mêlent dans tous les gazons. Seulement il faut avoir soin de le tondre avant que les fleurs soient desséchées, parce que les pieds s'altéreroient.

Il est excellent en mélange dans toutes les prairies; & même on le cultive seul comme une des meilleures herbes pour la pâture, sur-tout des moutons; ce qui le fait nommer par les Hollandois *Trefle à Moutons*.

Prairies naturelles.

POUR former un bon pré, le terrain doit être mis en bon état, bien brisé, ameubli, épier-ré, uni. Au printems on y sème un mélange de Graminées tirées des meilleurs prés; par arpent, de 6 à 15 septiers, suivant que ces graines sont nettes; on sème par dessus deux livres de grand Trefle rouge, deux livres de blanc, & une livre de jaune. On herse avec des branches d'épine, & on passe le rouleau. Si le printems est pluvieux, on fait deux coupes dès la première année.

On se trouve très-bien du mélange suivant, sur-tout pour les terrains un peu élevés. Pour un arpent,

Dix-huit boisseaux de Graminées des hauts Prés mêlées,	
Dix livres de Ray-grass d'Angleterre,	
Trois livres de grande Pimprenelle,	
Quinze livres de Fromental de France,	
Demi boisseau de Lupuline,	
Demie livre de Trefle rouge,	} mêler ces trois ensemble.
Deux livres de Trefle blanc,	
Deux livres de Trefle jaune,	

Nous tenons plusieurs autres sortes de fourages dont nous omettons les avantages & la culture, parce que tous les fermiers les connoissent assez; tels sont les Pois gris, la Gesse, le Lentillon, le Dick-Wurzel espece de Betterave cultivée en Allemagne pour la nourriture des Vaches en hiver, &c. &c.



VIII.

DIVERSES COUCHES.

*Couches pour Laitues de Primeur.*

- 1^o. **V**ERS la mi-octobre faire une couche très-légère, parce qu'alors il faut peu de chaleur artificielle; la couvrir de 3 ou 4 pouces de bonne terre grasse & meuble, ou de terreau bien consommé; y semer de la Laitue Gotte; jeter sur les cloches un peu de paille pour briser les rayons du soleil qui pourroit échauder la semence; lorsque la graine est bien levée, ne plus mettre de paille; laisser croître le plant jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour être repiqué. 2^o. Alors faire avec du fumier neuf une couche (ou plusieurs) en glaucis incliné au midi ou au levant, suivant l'exposition du terrain; le derrière de la couche aura de 18 à 24 pouces de hauteur, le devant n'en aura que le tiers, afin qu'elle présente mieux sa surface au soleil, & que les pluies s'écoulent davantage; la garnir de terre ou de terreau comme la précédente; repiquer le jeune plant; le visiter souvent pour retrancher toutes les feuilles pourries ou attaquées du blanc. Cette couche ne doit avoir

qu'une tiédeur ou chaleur très-douce ; car si elle étoit chaude , & que des tems trop rudes obligeassent de couvrir avec des cloches & des paillaçons , le plant périroit. 3°. Enfin en février faire des couches de deux pieds & demi ou trois pieds de hauteur de fumier neuf bien foulées & marchées ; lorsqu'elles ont jetté leur grand feu , les garnir de 6 ou 7 pouces au moins de bonne terre grasse & légère ; lorsqu'elles n'ont plus qu'une chaleur douce , y repiquer le plant , ne mettant que 5 pieds sous chaque cloche ; donner de l'air aux cloches autant qu'on le peut sans danger ; surtout éviter la grande chaleur.

On peut semer de même en novembre de la Romaine verte , des Laitues Sanguine , de Versailles , de Berlin , de Batavia , de Bergopzoom , &c. Il suffit de les repiquer sur des ados ou acôts de terreau , & de les défendre des fortes gelées avec des paillaçons.

*Couches pour Melons & Concombres
sous chassis.*

10. Dès le commencement de janvier faire une couche de 3 pieds de hauteur ; la garnir de bonne terre ; y placer le chassis ; lorsqu'elle a jetté son grand feu , y semer les graines ; la rechauffer , & soutenir une bonne chaleur jusqu'à ce que le plant soit en état d'être transplanté. (Si les couches sont sourdes , c'est-à-dire enterrées , lorsqu'elles sont montées en fumier au tiers de leur hauteur , il est bon de

mettre 8 ou 10 pouces de feuilles d'arbres ; sur-tout d'Orme, ramassées dans l'automne & entassées, ensuite achever en fumier ; elles soutiennent la chaleur plus long-temps.)

20. Faire de même de nouvelles couches ; y transporter le jeune plant ; ces secondes couches se font avec moitié de fumier neuf, & moitié du fumier qui a servi à faire d'autres couches, & qu'on nomme vieux fumier ; les rechauffer, & entretenir la chaleur jusqu'à ce que le plant ait été pincé, & commence ses premiers bras. (Si l'on sème dans de petits pots, le plant ne sera ni retardé ni fatigué par les transplantations.) 30. Faire de troisièmes couches plus ou moins hautes suivant la saison (en avril 18 pouces ou 2 pieds de fumier suffisent ;) les garnir de 10 à 12 pouces de bonne terre meuble & grasse préparée dès l'année précédente, afin que les engrais ne soient pas neufs ; y placer le plant aux distances convenables.

Les jeunes Melons ayant 4 ou 5 feuilles, outre les oreilles, ou cotyledons, les tailler au dessus de la seconde feuille, pour obtenir au moins deux branches. Cette première taille se fait ordinairement avant de mettre le plant en place. Des branches, lorsqu'elles ont 4 ou 5 feuilles, choisir les deux ou trois plus vigoureuses, & les tailler au dessus de la seconde feuille, pour multiplier les branches, qui se tailleront de même, si les deux tailles n'en ont pas donné un assez grand nombre, (de 4 à 8, suivant la vigueur du pied.)

Choisir celles qui sont fortes, bien placées, garnies de feuilles peu distantes les unes des autres.

Pendant que toutes ces branches se multiplient & se forment, retrancher les branches gourmandes, les foibles, les plattes, &c.

Laisser les bonnes branches s'allonger en liberté, jusqu'à ce qu'il y ait du fruit bien noué & arrêté (un sur chaque branche des variétés à gros fruit; deux au plus sur celles des variétés à petit fruit :) alors tailler ces branches à 1, 2 ou 3 feuilles au delà du fruit, suivant la force de la branche.

Après cette dernière taille, il sortira un grand nombre de jets de tous les yeux de la plante. Tous les huit jours en faire la revue; & en supprimer plus ou moins, suivant la vigueur de la plante & le nombre des fruits. Ce dernier point demande du discernement & de la pratique.

Melons & Concombres sous cloches.

10. A la fin de février ou au commencement de mars faire une couche de longueur proportionnée au semis, & seulement de largeur suffisante pour placer deux rangs de cloches, afin qu'elle soit plus facile & plus prompte à recevoir la chaleur des rechaufs qui seront nécessaires; semez vos graines (mieux en petits pots.)
20. Lorsque votre plant montrera ses premières feuilles, faire une autre couche, encore forte de fumier & étroite; y trans-

porter le jeune plant ; soutenir la chaleur par de bons rechaufs. 30. Lorsque le plant sera en état d'être mis en place , faire des couches moins fortes ; les garnir de terre comme il a été dit ci devant ; y placer le plant (en motte , s'il a été en pots ;) aussi tôt que ses racines seront attachées , ce qui arrive ordinairement en huit jours , faire de bons rechaufs de fumier neuf.

Si vous voulez planter quelques Melons & Concombres en pleine terre , laissez le plant le plus long-tems que vous pourrez sur les couches jusqu'à ce que la saison s'adoucisse ; faites de petites fosses dans un terrain bien exposé ; mettez dans chacune deux ou trois pelletées de terre préparée ; placez un pied dans chaque fosse , & couvrez jusqu'à ce qu'il soit repris ; cette précaution est inutile , s'il a été semé en pots.

Nota. Le fumier pour les couches ne doit avoir passé qu'une nuit , ou au plus deux , sous les chevaux.

*Couches de grande chaleur , pour Ananas
& Plantes étrangères.*

Ces couches se font ordinairement dans des Bâches maçonnées en brique ou en bonne pierre dure qui ne puisse laisser pénétrer l'humidité. Il est bien rare de trouver des terres assez sèches pour y faire ces couches sans maçonnerie. Quelques uns forment autour un enclos de fumier ou paille bien foulée & peignée
pour

pour que la pluie coule dessus. Chacun peut employer les moyens que lui fournira son industrie pour préserver ces couches du froid & de l'humidité.

Il faut employer le fumier le plus excellent & le plus moëlleux ; il est bon de l'étendre sur la terre à l'épaisseur d'environ 18 pouces pendant 15 ou 20 jours , le mouillant & le remuant plusieurs fois. Quoiqu'il jette son premier feu , il prend beaucoup plus de faveur.

Pour les couches d'hiver , mêlez à peu près partie égale de fumier & de feuilles d'arbres ; ces feuilles entretiennent une chaleur plus tempérée & plus durable , & absorbent l'humidité. Faites d'abord un lit d'un pied d'épaisseur ; foulez & marchez bien de bout en bout ; faites un second , un troisième , un quatrième lit de pareille épaisseur que vous marcherez de même ; de sorte que la couche bien foulée soit haute de 3 pieds. Si elle n'étoit pas faite par lits bien tassés , elle s'affaîsseroit par la suite à un point nuisible aux plantes , & vous seriez obligé de retirer la tannée , & de mêler une épaisseur suffisante de vieux fumier passé avec celui de la superficie de la couche , sans la remanier plus bas. Si le fumier est sec , il faut mouiller chaque lit ; s'il a été bien préparé , il n'a besoin d'être que fort peu mouillé. Si vous présumez que la couche jettera trop de chaleur , vous différerez d'y mettre la tannée , & vous placerez les chassis pendant 5 ou 6 jours , jusqu'à ce qu'il n'y ait plus à craindre qu'elle soit brûlée par

le grand feu de la couche ; sinon vous la mettez tout de suite. Si elle est humide , il faut la bien remuer trois ou quatre fois , ouvrir les chassis , à moins qu'il ne pleuve. Si vous en avez de vieille qui ait déjà servi , mêlez-en un tiers avec la neuve ; elle la desséchera & soutiendra plus long-tems sa chaleur. On enfonce quelques bâtons dans la tannée jusqu'au niveau du fond des pots ; en les retirant on connoît le degré de la chaleur. Lorsqu'elle est trop diminuée , on rechauffe la tannée , en y ajoutant & mêlant bien une moitié de tan neuf. Mais si la couche est bien faite , cette opération ne sera nécessaire qu'au bout de deux mois & demi. Les couches d'hiver se font à la fin d'octobre , ou au commencement de novembre.

Les couches du printems se font ordinairement au mois de mars. Les façons sont les mêmes que de celles d'hiver. Mais on y emploie moitié de vieux fumier avec moitié de neuf , sans feuilles d'arbres. Comme alors l'humidité n'est point à craindre , on peut faire la tannée avec tout tan neuf.

Couches à Champignons.

Quoique le Champignon soit de grand usage dans la cuisine , nous ne l'avons point placé entre les plantes potageres , parce que sa culture est aussi singulière , que ce Végétal est différent de tous les autres. Il naît sur deux sortes de couches , dont l'une se nomme Meule.

Couche. Au mois de décembre, dans un terrain sec & sablonneux, faites une tranchée de longueur à volonté, large de deux pieds, profonde de six pouces, bordée des terres de la fouille; (en terrain fort & humide faites la tranchée plus profonde, & remplissez l'excédent de six pouces de profondeur d'un lit de plâtras ou de pierrailles recouvert d'un peu de terre & de sable). Faites-y une couche de fumier court avec beaucoup de crotin (sans cependant être trop gras) de cheval qui ne mange point de son; bien dressée, bien marchée & foulée, en dos de bahut, haute de deux pieds à son sommet. Couvrez-la d'environ un pouce de terre, mêlée de sable ou de terreau, si elle est compacte. Au commencement d'avril couvrez-la de deux pouces de grande litière séchée. A la fin de mai elle doit commencer à produire. Tous les deux jours ôtez la litière; récoltez; recouvrez aussitôt; donnez un léger arrosement, si le tems est sec.

Meule. Près du lieu où doit être faite la meule, entassez du fumier de cheval avec le crotin; hors la portée des volailles & des animaux qui pourroient le fouiller ou le gratter: laissez-le pendant 30 ou 40 jours jeter son grand feu; trois semaines ou un mois, s'il est par petits tas.

Tracez au cordeau une longueur à volonté sur trois pieds de large, en lieu frais sans humidité, & un peu ombragé pendant l'été; bien exposé pendant les autres saisons, &

couvert de 8 ou 10 pouces de platras ou de pierraille & de quelques pouces de sable.

Maniez vos tas de fumier pour en retirer le foin & les longues pailles. Avec le fumier court & le crotin dressez votre meule, comme une couche ordinaire, haute d'un pied sur 3 pieds de large, & la longueur marquée sur le terrain préparé; mouillez-la amplement. Quatre ou cinq jours après, pour arrêter la trop grande chaleur, défaites la meule, remaniez le fumier, retirez-en environ un tiers (le plus long), remplacez-le avec autant de fumier neuf le plus court possible; avec ce tiers de fumier neuf & les deux tiers de fumier remanié, refaites la meule de deux pieds de largeur sur 15 pouces de hauteur; entassez à portée le tiers de fumier retiré en remaniant la meule. Si en remaniant la meule on y trouvoit une très-grande chaleur, on la rétablirait telle qu'elle étoit, & quelques jours après on la remanieroit une seconde fois).

Six jours après que la meule a été refaite & fixée, faites avec la main tout le long de son flanc (de ses flancs, si elle n'est pas faite contre le pied d'un mur) un rang de trous distants d'environ un pied, 6 ou 8 pouces au dessus du sol. Mettez dans chaque trou, à fleur des fumiers & non trop enfoncé, un morceau de 3 ou 4 pouces de *blanc de Champignon*. (Nous pouvons en fournir de très-bon en toutes saisons). Aussi-tôt que la meule est lardée de *blanc*, on remet par dessus environ le tiers du fumier resté en la remaniant, & on dresse le sommet en dos de bahut.

Deux ou trois jours après battez , avec une pelle , tout le pourtour de la meule , pour mastiquer & incorporer le *blanc* avec les fumiers ; arrachez toutes les pailles qui débordent ; couvrez toute la surface de la meule d'un pouce de bonne terre meuble , ou ameublie avec du sable ou du terreau ; & jetez par dessus trois pouces de grand fumier neuf (moins sur le dos ou sommet qui ne doit être couvert que légèrement). Huit jours après ajoutez encore autant de fumier neuf , avec la même attention d'en mettre peu sur le sommet de la meule.

Huit jours après , découvrez tout-à-fait la meule : nettoyez-en bien toute la superficie des ordures que les couvertures y ont laissé. Sécouez le fumier de ces couvertures ; avec le plus long refaites une légère couverture , d'environ un doigt d'épaisseur ; jetez par dessus environ trois pouces d'épais de fumier neuf qui aura ressuyé en tas pendant huit jours , & encore par dessus le reste des fumiers remaniés lorsque la meule a été fixée , avec la même attention de ne pas trop charger le dos de la meule.

Quinze jours après , découvrez-la jusqu'à la chemise exclusivement (c'est la petite couverture d'un doigt d'épais) ; regardez dessous si le Champignon se forme ; marquez avec de petites baguettes les places où il en paroît , & remettez les couvertures.

Quatre ou cinq jours après , visitez les places , sans découvrir la meule , & cueillez les

Champignons, s'il y en a de bons. Quatre ou cinq autres jours après, même visite & même opération.

Enfin, lorsque la meule paroît disposée à produire par-tout également, tous les trois jours (en hiver tous les cinq jours) découvrez la meule, récoltez, recouvrez aussi tôt; en été dans les temps secs, mouillez légèrement après chaque récolte. En hiver augmentez les couvertures, suivant le degré du froid.

Souvent toute la vigilance du Jardinier est insuffisante pour préserver une meule en plein air des dangers qu'elle court dans les orages, les pluies, la sécheresse, le froid, le chaud, &c. C'est pourquoi il vaut mieux l'établir dans une serre, ou autres bâtimens couverts: elle exige les mêmes façons; mais elle y court moins de dangers.

Elle est encore beaucoup mieux dans une cave. Elle s'y prépare comme il vient d'être expliqué; mais lorsqu'elle est gottée de terre, comme nous avons dit, elle n'a besoin ni de chemise ni d'autres couvertures, ni d'aucun soin, pourvû que les portes & les soupiraux soient si bien fermés, que l'air ne puisse y pénétrer.





C H A U L A G E.

DANS un vaisseau contenant environ un muid & demi, mettez crotin de mouton, fiente de pigeon, fiente de poule, crotin de cheval, mulot ou âne, bouze de vache, environ un boisseau de chacun; fuye de cheminée, un boisseau & demi; & si le terrain à ensemen- cer est froid & humide, un boisseau de chaux éteinte dans de la lessive, ou de l'eau de marre. Remplissez le vaisseau d'eau de lessive dans laquelle vous aurez fait bouillir du genêt. Si quelqu'un de ces ingrédients vous manque, augmentez la dose des autres: si vous n'avez pas assez de lessive, prenez du jus de fumier, ou de l'eau d'une marre de basse-cour. Pendant quatre ou cinq jours, remuez bien avec un gros bâton tous ces ingrédients deux fois par jour, jusqu'à ce qu'ils fermentent.

Lorsque vous voulez préparer du froment ou toute autre graine, remuez bien cette liqueur, jetez-en sur la semence (environ un bon sceau pour un septier de Paris.) Avec une pelle remuez le grain jusqu'à ce que tous les grains paroissent mouillés de la liqueur; ramassez-le en tas, & laissez-le 7 ou 8 heures; remuez-le de nouveau, de peur qu'il ne s'échauffe; remuez-le une troisième fois, il sera assez sec pour être semé. Vous pouvez différer

pendant un mois de le semer , pourvû que vous le remuiez deux fois par jour.

Les avantages de ce Chaulage sont assez connus pour tous les grains & les graines de fourages. Ils ne sont pas moindres pour les graines potageres & celles des fleurs. Si un arbre languit , labourez au pied , formez-y un bassin dans lequel vous verserez un sceau ou deux de cette liqueur mêlée d'eau de marre ou de jus de fumier , pour la rendre plus liquide. Si un semis sur couche , ou en pleine terre , est attaqué du puceron , du ver , de la chenille , ou autre insecte , arrosez - le avec cette liqueur détrempée dans une quantité suffisante d'eau ou de jus de fumier pour qu'elle passe aisément par le criblet de l'arrosoir. En un mot , cette liqueur devrait être d'un usage aussi fréquent dans le jardinage , que dans les grandes cultures. Elle peut se conserver très-long-tems.

Ratafia de Fleurs de Moldavique.

CUEILLEZ les Fleurs à midi dans de beaux jours ; dépouillez-les de leur calice , & mettez - les aussi-tôt infuser au soleil dans de l'eau-de-vie , ayant soin d'ajouter de l'eau-de-vie , à mesure que vous ajoutez des fleurs , de sorte qu'elle les surpasse toujours. Après deux mois d'infusion , passez la liqueur dans une chausse & pressez le marc.

Mesurez la liqueur, & ajoutez-y pareille quantité d'eau de-vie pure ; pesez 20 onces de sucre par pinte mesure de Paris ; faites-le clarifier dans une poêle sur un fourneau à grand feu de charbon. Lorsqu'il est réduit en sirop , jetez dans la poêle l'infusion & l'eau-de-vie ; laissez le tout ensemble jeter quelques bouillons ; retirez du feu ; & lorsque la liqueur est refroidie , passez-la dans une toile neuve & serrée ; laissez-la refroidir entièrement dans un vaisseau de fayance couvert d'un papier & de linge ; mettez en bouteilles , que vous ne boucherez que le lendemain.

Quoique , par ce procédé , on semble ôter beaucoup de force au Ratafia , il lui en reste assez pour être très agréable & très-salutaire. On sçait que la Moldavique a toutes les propriétés de la Melisse.

Lorsqu'on élève cette plante pour cet usage, il est bon de la semer dès le mois de mars sur couche, afin d'en recueillir les fleurs dans l'été.

Ratafia des Sept-Graines.

PRENEZ de la graine d'Anis , d'Anet , de Carvi , de Coriandre , de Carotte , & de Fenouil , de chacune une once , & deux gros d'Angélique musquée. Mettez le tout dans une bouteille de verre ou une cruche avec 4 pintes d'eau-de-vie. Laissez infuser pendant 15 jours en été , ou trois semaines en hiver ; ayant soin

de remuer tous les jours la bouteille pour empêcher la liqueur de se graisser, & de l'exposer au soleil, s'il est possible. Passez l'infusion à la chauffe; jetez-y de six à huit onces de sucre par pinte fondu dans demi-septier d'eau; & repassez le tout à la chauffe.

Ce Ratafia, très-connu & très-estimé, se peut faire en toute saison. Nous fournissons ces graines fraîches & de la meilleure qualité, criblées, mêlées, & toutes prêtes à infuser.

F I N

